

FORMULARIO DE SOLICITUD DE OTOMISIONES ACUSTICAS (OEA)

Apellido materno: _____

Habit.: _____ HC: _____

Teléfono: _____

Sector: _____

Dirección: _____

SI TIENE ALTO RIESGO AUDITIVO.

Antecedentes familiares de primer grado de pérdida auditiva antes de los 18 años ó consanguinidad en padres y/o abuelos.

Peso al Nacer menor ó igual a 1500 gr y/o Edad Gestacional al nacer menor ó igual a 32 semanas.

Hiperbilirrubinemia con valores de exanguinotransfusión (c/s EXT realizada).

Apgar al minuto menor ó igual a 4 y/o Apgar a los 5 minutos menor ó igual a 6.

Ventilación mecánica de cualquier duración (incluye CPAP).

Estadía en la Terapia Neonatal por más de 5 días.

Ototoxicos = cualquier exposición.

-Furosemida.

- Aminoglucósidos.

Meningitis* (tildar cual)

-Bacterianas (Neumococo, Estreptococo, otras)

-Virales (Herpes, VVZ, otras)

Torch (tildar cual)

-Toxoplasmosis neonatal

-CMV neonatal*

-Sífilis neonatal

-Herpes virus.

-Rubeola.

- Anomalías craneofaciales (tildar cual)
 - Alteración conducto auditivo externo.
 - Mamelones, hoyuelos pre auriculares.
 - Malformaciones auriculares.
 - Malformaciones del Conducto Auditivo Externo.
 - Hoyuelos-Mamelones Preauriculares.
 - Anomalías del Pabellón de la Oreja.
 - Anomalías del Paladar.
 - Atresia de Coanas.
 - Craneosinostosis.

- Síndromes asociados a hipoacusia (ver listado plastificado):

Traumatismo Craneoencefálico (especialmente con fractura de base de cráneo o de temporal).

Desórdenes Neurodegenerativos (Hunter, Ataxia de Friedreich, Charcot Marie Tooth).

- Lesiones Neurológicas Severas (Leucomalacia Periventricular Quística, Hemorragia Intracraneana grados III-IV, Hidrocefalia, Accidentes Cerebro Vasculares, etc).

- Hipotiroidismo Congénito.

Abuso Materno de Sustancias: Cocaína y Síndrome Alcohólico Fetal.

*Quimioterapia.

NO TIENE ALTO RIESGO AUDITIVO.
