



GOBIERNO
DE LA PROVINCIA
DEL NEUQUÉN

MINISTERIO
DE SALUD

SUBSECRETARÍA
DE SALUD

NEUQUÉN
PROVINCIA

JUNTOS
PODEMOS
MÁS

Formulario Terapéutico Provincial de Neuquén

VERSIÓN ACTUALIZADA AL 01/01/2020



**GOBIERNO
DE LA PROVINCIA
DEL NEUQUÉN**

**MINISTERIO
DE SALUD**

**SUBSECRETARÍA
DE SALUD**

NEUQUÉN
PROVINCIA

**JUNTOS
PODEMOS
MÁS**

AUTORIDADES

GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

Dr. Omar Gutierrez

VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA

Cr. Marcos Koopmann

MINISTRO DE SALUD

Dra. Andrea Peve

DIRECTOR PROVINCIAL DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLOGÍAS BIOMÉDICAS

Dr. Osvaldo Neder

COORDINADOR DEL COMITÉ PROVINCIAL DE BIOTECNOLOGÍAS

Dr. Santiago Hasdeu

COORDINADORA DEL COMITÉ PROVINCIAL DE MEDICAMENTOS

Dra. Guadalupe Montero



GOBIERNO
DE LA PROVINCIA
DEL NEUQUÉN

MINISTERIO
DE SALUD

SUBSECRETARÍA
DE SALUD

NEUQUÉN
PROVINCIA

JUNTOS
PODEMOS
MÁS

COLABORADORES:

Alemany Noemí

Bega Betina

Betucci Miriam

Biasatti Andrea

Cano Mabel

Carrasco Gabriela

Campo Daiana

Colletti Pablo

Del Alli Cesar

Gerstenmaier Walter

Guevara Cecilia

Laplace Mirta

Lococo Alejandra

Lujan Marcela

Manoukian Daniel

Parodi Adriana

Piccoli Darío

Sánchez Agustín

Ramat Amanda

Ruiz Ernesto

Schwartzman Sergio

Villafañe Daniela

Zufiria Claudia



Presentamos la versión escrita actualizada del Formulario Terapéutico Provincial (FTP), para ser utilizado en todos los establecimientos de atención del Subsector Público de Salud de la Provincia de Neuquén.

El mismo sigue los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, y se ha actualizado gracias al esfuerzo de todos los profesionales de salud que, a través de sus pedidos de incorporación, baja o modificación de medicamentos al FTP, han movilizado el análisis crítico de la evidencia científica disponible, así como las variables sociales, epidemiológicas, legales, y económicas locales por parte del Comité Provincial de Medicamentos de Neuquén. Este FTP se encuentra en constante revisión y son bienvenidas todas las observaciones en este sentido.

Se encuentran disponibles documentos sobre los mecanismos y formularios para solicitar la incorporación de nuevos medicamentos al FTP, pedidos por excepción para pacientes puntuales, Informes de evaluación de medicamentos y otras tecnologías sanitarias, las misiones y funciones del Comité Provincial de Medicamentos, sus miembros, las declaraciones de conflictos de interés de quienes participaron en la actualización del FTP, entre otros documentos de interés.

Fundamentación:

Los **OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE** de las **NACIONES UNIDAS** plantean, en su Punto 3.8: “Lograr (...) el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos”.

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Naciones Unidas - CEPAL

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) el acceso a los medicamentos constituye un elemento fundamental del derecho a la salud y este a su vez es considerado como uno de los derechos inalienables que el estado tiene la obligación de garantizar para su población. La OMS define a los medicamentos esenciales como aquellos que satisfacen las necesidades de asistencia sanitaria de la población y que por lo tanto deben estar disponibles en todo momento, en cantidades adecuadas, en las formas farmacéuticas y dosis apropiadas.

Selección y uso de los medicamentos esenciales. Informe del comité de expertos de la OMS. OMS Ginebra 2002.

La provincia de Neuquén sigue desde hace muchos años las recomendaciones de la OMS descriptas, manteniendo una actualización periódica de su FTP. Se incluyen en este FTP los medicamentos con mayor evidencia de eficacia, efectividad, seguridad y costo-efectividad para los principales problemas de salud de la población de Neuquén.



Nuestro Formulario Terapéutico ha adaptado el formulario de la OMS a la realidad local, teniendo en cuenta aspectos epidemiológicos y la organización de la red de prestaciones por niveles crecientes de atención propios de nuestro subsector de Salud en Neuquén.

Preguntas frecuentes sobre el Formulario Terapéutico Provincial:

¿Cómo utilizar este FTP?

Los medicamentos se encuentran por sistemas o aparatos (antibióticos, cardiovasculares, etc.) siguiendo la recomendación de la OMS para facilitar la búsqueda. Para cada medicamento se encontrará, además, la recomendación del Comité Provincial de Medicamentos sobre:

- Forma farmacéutica y presentación
- Los especialistas habilitados para realizar la primera prescripción
- El nivel de complejidad donde deben estar siempre disponibles en stock
- Las indicaciones de uso aprobadas y en algunos casos las restricciones, así como observaciones que se consideren importantes.
- La existencia de una Guía de Práctica Clínica, Recomendación de uso o Informe de Evaluación considerado válido para nuestra provincia, que pueda ser de ayuda para el profesional prescriptor o el farmacéutico.
- Fármacos que conforman los botiquines o carros de emergencia y de uso toxicológico según nivel de complejidad.
- La necesidad de vigilancia intensificada, consentimiento informado o evaluación de historia clínica por comité de medicamentos.

Para una información más amplia sobre los medicamentos incluidos en este FTP se recomienda consultar en la literatura especializada, con los especialistas de referencia de cada área o con el comité de medicamentos.

Para los farmacéuticos, directores o referentes de guardia de emergencias de cada centro de atención puede ser útil el formato por nivel de complejidad del total de medicamentos o del carro de emergencia, para poder hacer una lectura rápida de los medicamentos que deben contar en stock.

¿Cómo se denominan los medicamentos en el FTP?

Siguiendo las recomendaciones de la OMS y cumpliendo con la legislación Argentina se utiliza en este FTP la denominación común internacional o nombre genérico de los medicamentos.

Decreto de Necesidad y Urgencia 486/02, y Ley Nacional de Promoción de prescripción por nombre genérico n° 25.649/02, aprobada por el Congreso Nacional. Ley 2392 de Genéricos de la Provincia de Neuquén.



¿Cuál es el nivel de complejidad y el Profesional habilitado para realizar la primera prescripción?

Una vez que un especialista indica el inicio de un tratamiento crónico con un medicamento de uso restringido a la alta complejidad, las subsiguientes recetas podrán ser realizadas por el médico general en el lugar de atención local del paciente, mientras el especialista así lo indique y hasta el nuevo control estipulado. Como ejemplos: Un tratamiento antiretroviral sólo podrá ser indicado de primera vez por el equipo multidisciplinario del que participa un infectólogo, un nuevo tratamiento con un antiepiléptico de segunda o tercera línea para una epilepsia refractaria sólo podrá ser indicado por el neurólogo, etc. Luego se gestionarán entre la Subsecretaría de Salud, la Zona Sanitaria y el Centro de Atención local del paciente, los aspectos logísticos para que el paciente reciba el medicamento en su localidad sin necesidad de traslados innecesarios. Según cada caso, el especialista deberá confirmar por nueva receta que el paciente continúa en tratamiento en intervalos periódicos (Ej: cada 6 meses o 12 meses).

¿Por qué no están en el FTP todos los medicamentos comercializados en el país?

La OMS recomienda fuertemente seleccionar del mercado farmacéutico aquellos medicamentos que cumplan con evidencias científicas de efectividad, seguridad y conveniencia. Si bien por un lado existe un alto porcentaje de renovación del mercado farmacéutico, diversos especialistas, por ejemplo en Francia, coinciden en que más de la mitad de los nuevos fármacos comercializados no aportan “nada nuevo”, mientras que uno de cada seis nuevos medicamentos presentan más riesgos que beneficio por lo cual resultan inaceptables. Muchos de los nuevos fármacos comercializados son modificaciones mínimas a moléculas ya conocidas que no vienen a aportar ningún beneficio clínico relevante para los pacientes.

Editorial Staff. New products and new indications in 2016: a system that favours imitation over the pursuit of real progress. *Prescrire International*. 2017;26(182):136-139/ Drugs in 2018 a brief review. *Prescrire international* 2019; 28 (203): 105-107

Rev *Prescrire* February 2012; 32 (340): 134-140. New drugs and indications in 2011. France is better focused on patients' interests after the Mediator° scandal, but stagnation elsewhere.

Hollis A. Me-too drugs: is there a problem? 2004. http://www.who.int/entity/intellectualproperty/topics/ip/MeTooDrugs_HollisI.pdf

A nivel Europeo, recientemente se describió que solo el 10% de medicamentos aprobados entre 1999- 2005 por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) superan a los fármacos existentes por su efecto sobre desenlaces clínicos. La agencia alemana para la Calidad y la Eficiencia en el Cuidado de la Salud (IQWiG) revisó en 2019 los medicamentos que se incorporaron en ese país entre 2011 y 2017, encontrando que la mitad de las nuevas moléculas no aportan beneficios para los pacientes, comparado con los medicamentos con los que ya se contaba.

van Luijn JCF, Gribnau FWJ, Leufkens HGM. Superior efficacy of new medicines? *European Journal of Clinical Pharmacology*. 2010;66(5):445-448.

Wieseler B. et al. New drugs: where did we go wrong and what can we do better. *BMJ* 2019;366:l4340



Resultados similares se encontraron en Brasil; En 2013 la agencia regulatoria estatal de Brasil, ANVISA, evaluó 1115 presentaciones de 433 medicamentos que se registraron en ese país entre 2004 y 2011. Encontró que solo un 3,24% de ellos representaban una verdadera ganancia en beneficios terapéuticos comprobados comparado con los fármacos ya existentes.

Gabrielle Cunha Barbosa Cavalcanti y colaboradores. Efeitos da Resolução CMED nº 02/04 no processo de análise de preços de novos medicamentos. Gerência de Avaliação Econômica de Novas Tecnologias. Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Brasília janeiro 2013.

En Argentina, un reciente estudio evaluó los nuevos medicamentos comercializados en Argentina en el año 2016, utilizando diferentes enfoques: su aprobación por otras agencias reguladoras, demostración de eficacia en ensayos clínicos aleatorizados, tipo de desenlaces estudiados, calificación del valor terapéutico agregado por medio de dos escalas reconocidas y el precio de venta al público. Se concluye que, como reflejo de lo que ocurre en los países desarrollados, los nuevos medicamentos ingresan con precios exorbitantes, pero la mayoría no representa un avance terapéutico significativo. El resultado es un aumento de riesgos para los pacientes y una sobrecarga para los sistemas de financiación públicos y privados.

Martín Cañas, Héctor Omar Buschiazzi, Martín Alejandro Urtasun. Valor terapéutico y precio de los nuevos fármacos comercializados en Argentina: ¿valen lo que cuestan? SALUD COLECTIVA. 2019;15:e1962. doi: 10.18294/sc.2019.1962

Esto ocurre en un contexto mundial donde un tercio de la población carece de acceso a los medicamentos esenciales, y donde no se observa una correspondencia entre las necesidades de salud pública de los países y los nuevos medicamentos lanzados al mercado en esos mismos países.

Mordujovich P. Accesibilidad a los medicamentos. Medicamentos y salud. 2000. 3(3) 105-109. Disponible en <http://femeba.org.ar/fundación/index.htm>
Carlos Cesar Flores Vidotti, Lia Lusitana Cardozo de Castro, Simone Saad Calil. New drugs in Brasil. Do they meet Brazilian public health needs? Rev Pan Salud Pública. Pan Am Public Health 24 (1) 2008 Pécoul B, Chirac P, Trouiller P, Pinel J. Access to essential drugs in poor countries: a lost battle? JAMA. 1999 Jan 27;281(4):361-7.



INDICE

I	Sistema respiratorio.....	10
II	Sistema cardiovascular	13
III	Anti infecciosos (antibacterianos, antiparasitarios, antivirales, anti fúngicos)	23
IV	Analgésicos opioides	42
V	Analgésicos no opioides, corticosteroides, antirreumáticos y dermatológicos.....	44
VI	Drogas con acción metabólica y soluciones parenterales	54
VII	Drogas que afectan el sistema gastrointestinal.....	62
VIII	Sangre	67
IX	Sistema endocrino.	71
X	Sistema nervioso central	77
XI	Antihistamínicos	88
XII	Aparato genitourinario.....	89



XIII	Drogas de uso oftalmológicos, otorrinolaringológicos y odontológicos	92
XIV	Inmunología y vacunas	97
XV	Antisépticos y desinfectantes.....	99
XVI	Anestésicos	102
XVII	Bloqueantes neuromusculares	106
XVIII	Antineoplásicos e inmunosupresores.....	108
XIX	Contrastes radiológicos	118
XX	Emergencias toxicológicas	121
XXI	Contraceptivos.....	135
	Abreviaturas	138
	Bibliografía	139

01. SISTEMA RESPIRATORIO

BRONCODILADORES

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
----------------------	------------------------	--	----------------------------	---------------------	--------------	--

AGONISTAS ADRENORECEPTORES AGONISTAS SELECTIVOS BETA 2

2		MG		SI	SALBUTAMOL 0,5 % solución para nebulizar x 20 ml	Hiperreactividad bronquial, Asma.
2		MG		SI	SALBUTAMOL aerosol completo x 200 dosis	Hiperreactividad bronquial, Asma.
4		NEU	Con dictamen del CPM/ CHPN		BUDESONIDE FORMOTEROL 200 / 6 mcg aerosol	Segunda línea en tratamiento de Asma.

OTROS AGENTES ADRENORECEPTORES

2		MG		SI	ADRENALINA 1 mg/ml ampollas	Anafilaxia. Crisis asmática severa. Paro cardiorrespiratorio, asistolia, FV/TV, DEM
---	--	----	--	----	--------------------------------	---

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
----------------------	------------------------	--	----------------------------	---------------------	--------------	--

ANTIMUSCARÍNICOS BRONCODILADORES

2		MG			IPRATROPIO aerosol	EPOC, ASMA
2		MG		SI	IPRATROPIO solución para nebulizar x 20 ml.	EPOC, ASMA
4		NEU	Con dictamen del CPM/ CHPN		TIOTROPIO 18 mcg cápsula inhalatoria	EPOC, ASMA severo

CORTICOIDES INHALATORIOS

2		MG			BUDESONDE 1 mg/ml solución para nebulizar x 20ml.	Laringitis aguda en pediatría, EPOC, ASMA
2		MG			BUDESONDE 200 mcg aerosol	Uso en pediatría para ASMA bronquial, EPOC, Hiperreactividad bronquial

SURFACTANTES PULMONARES

4			G		SURFACTANTE PULMONAR frasco ampolla 8 ml 240 mg	Tratamiento de enfermedad de membrana hialina. Dosis según peso. Requiere cadena de frío.
---	--	--	---	--	---	---

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
----------------------	------------------------	--	----------------------------	---------------------	--------------	--

ESTIMULANTES DEL CENTRO RESPIRATORIO

4		NEO,AN			TEOFILINA O AMINOFILINA ANHIDRA 200 mg ampollas	apneas del prematuro, uso en anestesia
4		PED			CAFEINA PURA Anhidra polvo via oral	Apneas del neonato

ANTITUSSIVOS

3		MG	Ley de estupefacientes N°23737		MORFINA jarabe estabilizado 0,2% suspensión	Analgésico opiode. Paliativos. Quemados. Tratamiento del dolor. Antitusivo
4		MG	Ley de estupefacientes N°23737		MORFINA sulfato 30 mg comprimidos	Analgésico opiode. Paliativos. Quemados. Tratamiento del dolor. Antitusivo

OTROS FÁRMACOS

2		MG, Terapias			AGUA BIDEUTILADA sachet x 500 ml	Incubadoras, humidificadores de oxígeno suplementario en internación y VNI domiciliario
---	--	--------------	--	--	----------------------------------	---

02. SISTEMA CARDIOVASCULAR

FÁRMACOS INOTRÓPICOS

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
3		MG		SI	DOPAMINA 100 mg frasco ampolla	Efecto según dosis (aproximado): diurético 1-5 μ g/kg/min, inotrópico 5-10 μ g/kg/min, vasopresor >10 μ g/kg/min. Tratamiento del shock cardiogénico, y bradicardia sintomática. En nivel 3 sólo para uso en carro de emergencia y durante derivaciones. En pacientes sépticos con patología cardíaca pre-existente preferir Noradrenalina como vasopresor.
4		CM, CAR, UTIA, NEO			DOBUTAMINA 250 mg frasco ampolla	Tratamiento del shock cardiogénico. Incrementa la contractilidad miocárdica con poco aumento de la frecuencia cardíaca o de la resistencia periférica. Uso en Terapias Intensivas, Intermedias y UCI. En nivel 8 puede utilizarse junto al ecocardiograma para valorar enfermedad coronaria. En nivel 4 sólo para carro de Emergencias y derivaciones.
6		CAR, UTIA		SI	ISOPROTERENOL 1 mg ampollas	Bradicardia severa, Crisis aguda de Stokes-Adams
2		MG		SI	DIGOXINA 0,25 mg ampollas	Control de frecuencia en Fibrilación auricular crónica de alta respuesta ventricular
4		CM, CAR, PED			DIGOXINA 0,25 mg comprimidos	Insuficiencia cardíaca congestiva en clase funcional avanzada, control de frecuencia en fibrilación auricular crónica. Realizar control de función renal y kalemia, mayor riesgo de intoxicaciones ante hipokalemia. Toxicidad: gastrointestinal y arritmias
8		CAR INF		SI	DIGOXINA 0,75 mg solución oral	Insuficiencia cardíaca congestiva, control de frecuencia en fibrilación auricular. Ver diferencias de dosificación según laboratorio.
8		UTIP			MILRINONA 10 mg frasco ampolla x 10 ml	Postquirúrgico inmediato de cardiopatías congénitas

02. SISTEMA CARDIOVASCULAR

FÁRMACOS ANTIARRÍTMICOS

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMERA PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
2		MG		SI	AMIODARONA 150 mg ampollas	Arritmias Supraventriculares y Ventriculares
3		MG			AMIODARONA 200 mg comprimidos	Arritmias Supraventriculares y Ventriculares
3		MG		SI	ADENOSINA 6 mg ampollas	Taquicardia Paroxística Supraventricular
2		MG		SI	LIDOCAINA 2% SE frasco ampolla x 20 ml	Antiarrítmico de segunda línea. Uso en arritmias ventriculares. Anestésico local
4		CM, CAR		SI	PROPRANOLOL 5 mg ampollas	Taquiritmia, IAM, Angor Inestable, Hipertiroidismo grave
4		CM, CAR, UTIA, NEO		SI	DILTIAZEM 25 mg ampollas	Taquicardia Paroxística Supraventricular segunda línea, control de frecuencia en FA de alta respuesta ventricular
2		MG		SI	ATROPINA 1 mg ampollas x 1ml	En bradiarritmias y Asistolia dosis 1 mg hasta 0,04 mg/kg. En la Intoxicación por Organofosforados si hay bradicardia se administran dosis crecientes hasta lograr FC > 50% de la esperada para edad. Una vez alcanzada la FC objetivo, dejar dosis de mantenimiento de 0,01 a 1 mg/Kg/hora que se regula según FC. Cuando se inicia el tratamiento el paciente no debe estar cianótico/hipoxico porque esto potencia el riesgo de FV.

02. SISTEMA CARDIOVASCULAR

FÁRMACOS ANTIHIPERTENSIVOS

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD PARA REALIZAR LA PRESCRIPCIÓN	HABILITADA LA PRIMER	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
----------------------	------------------------	--	----------------------	----------------------------	---------------------	--------------	--

FÁRMACOS VASODILADORES

6		UTIA, UTIP, CM			SI	NITROPRUSIATO de SODIO 50 mg ampolla	Crisis hipertensivas, manejo de la HTA severa en pacientes con ACV. Uso con bomba de infusión y monitoreo estricto de TA. Protección de la luz.
3		MG			SI	NITROGLICERINA 25 mg ampolla	Edema agudo de pulmón hipertensivo, Angina de pecho inestable, infarto. Uso con bomba de infusión
2		MG			SI	ISOSORBIDE DINITRATO 5 mg comprimidos	Edema Agudo de Pulmón Hipertensivo, Angina de pecho. Alto riesgo de hipotensión.
4		CAR				ISOSORBIDE mononitrato 20 mg comp.	Angor crónico estable
4		CAR				ISOSORBIDE mononitrato 60 mg AP comp.	Angor crónico estable. Liberación prolongada

FÁRMACOS ANTIHIPERTENSIVOS DE ACCIÓN CENTRAL

4		GIN, MG				CLONIDINA 0,15 mg ampollas	Eclampsia, 2 línea en Hipertensión severa del embarazo
2		MG				ALFAMETILDOPA 500 mg comprimidos	1 línea en HTA del embarazo. En HTA esencial no es de primera línea.

02. SISTEMA CARDIOVASCULAR

FÁRMACOS ANTIHIPERTENSIVOS

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
----------------------	------------------------	--	----------------------------	---------------------	--------------	--

FÁRMACOS ANTIHIPERTENSIVOS Y QUE REGULAN EL SISTEMA RENINA -ANGIOTENSINA

2		MG			ENALAPRIL 20 mg comprimidos	Hipertensión Arterial, Insuficiencia cardíaca, proteinuria, nefropatía
2		MG			ENALAPRIL 5 mg comprimidos	Hipertensión Arterial, Insuficiencia cardíaca, proteinuria, nefropatía
4		CM, CAR, NEF			LOSARTAN 50 mg comprimidos	Monoterapia: sólo en pacientes con S.Nefrótico o proteinuria con reacción adversa reportada al Enalapril. En politerapia: sólo cuando hay reacción adversa reportada al Enalapril, y ya recibe un diurético, un betabloqueante y un bloqueante cálcico. En pacientes con S.Nefrótico o proteinuria refractaria a dosis máxima de Enalapril puede agragarse Losartán

BLOQUEANTES CÁLCICOS

4		CAR			DILTIAZEM 120 mg comp. Acción prolongada	Angina crónica, Taquicardia paroxística supraventricular, control de frecuencia en FA crónica anticoagulado
4		CAR			DILTIAZEM 60 mg comprimidos	Taquicardia paroxística supraventricular, control de frecuencia en FA crónica anticoagulado. Segundo escalón de tratamiento según indicación de cardiología en angina crónica
4		MG			NIFEDIPINA 20 mg comp. de acción prolongada	Hipertensión pulmonar, HTA refractaria no de primera línea, Fenómeno de Raynaud. 2 línea en HTA Contraindicado su uso sublingual. APP

02. SISTEMA CARDIOVASCULAR

FÁRMACOS ANTIHIPERTENSIVOS

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRESCRIPCIÓN	PARA PRIMER	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
----------------------	------------------------	---	-------------	----------------------------	---------------------	--------------	--

BLOQUEANTES CÁLCICOS

3	SI	MG			SI	NIFEDIPINA 10 mg comp.	Amenaza de parto prematuro, hipertensión del embarazo, hipertensión pulmonar. Contraindicado su uso sublingual
6		UTIA				NIMODIPINA 60 mg comp	Uso en Hemorragia subaracnoidea no traumática
4		MG				AMLODIPINA 10 mg comprimidos	2 línea en tratamiento en combinación de HTA esencial.

BLOQUEANTES BETA ADRENÉRGICOS

2		MG				ATENOLOL 100 mg comprimidos ranurados	HTA, Taquicardias Supraventriculares
2		MG				ATENOLOL 50 mg comprimidos ranurados	HTA, Taquicardias Supraventriculares
4		CM				CARVEDILOL 25mg comprimidos ranurados	Insufic. Cardíaca sistólica. No autorizado para pacientes hipertensos sin este diagnóstico confirmado porecocardiograma.
4		CM				CARVEDILOL 6,25 mg comprimidos ranurados	Insufic. Cardíaca sistólica. No autorizado para pacientes hipertensos sin este diagnóstico confirmado porecocardiograma.

02. SISTEMA CARDIOVASCULAR

FÁRMACOS ANTIHIPERTENSIVOS

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
----------------------	------------------------	--	----------------------------	---------------------	--------------	--

BLOQUEANTES BETA ADRENÉRGICOS

8		NEO, UTIP,			FENILEFRINA ampollas 10 mg	Recuperación cardiovascular post cirugía cardíaca.
3 Y 4	SI	GIN, UTIA, Terapias intermedias, ER		SI	LABELALOL 200 mg comprimido, ampollas	Primera línea en HTA severa del embarazo. Plan Materno Infantil. Hipertensión asociada a ACV o encefalopatía hipertensiva. No autorizado para hipertensión severa aislada.
2		MG			PROPRANOLOL 40 mg comprimidos 5 mg ampollas	Prevención de sangrado digestivo variceal en Hipertensión Portal, Profilaxis de migraña, Hipertiroidismo, 1ª línea en temblor esencial.

DIURÉTICOS

2	SI	MG			ESPIRONOLACTONA 25 / 100 mg comprimidos	Síndrome Ascítico Edematoso, Insuficiencia Cardíaca CF III-IV. Monitoreo de hiperkalemia
2		MG			HIDROCLOROTIAZIDA 25 mg comprimido	De primera línea para HTA esencial no complicada. No hay beneficios adicionales con dosis >25 mg/día
2		MG		SI	FUROSEMIDA 20 mg/ml. Amp x 2 ml.	ICC descompensada - Síndrome edematoso
2		MG			FUROSEMIDA 40 mg (o 50 mg) comp	ICC, síndrome ascítico edematoso
8		PED, UTIA, NEO, NEF			FUROSEMIDA 2% gotas x 15 ml.	ICC en pacientes pediátricos

02. SISTEMA CARDIOVASCULAR

FÁRMACOS ANTIHIPERTENSIVOS

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
----------------------	------------------------	--	----------------------------	---------------------	--------------	--

DIURÉTICOS

3		MG		SI	MANITOL 15 % x 250 ml	Diurético osmótico. Tratamiento de la Hipertensión endocraneana en Traumatismo craneoencefálico grave para traslado y previo a la cirugía descompresiva.
---	--	----	--	----	--------------------------	--

VASOPRESORES

2		MG		SI	ADRENALINA 1 mg/ml ampollas	Anafilaxia. Crisis Asmática severa. Paro cardiorrespiratorio, asistolia, FV/TV, DEM.
4		CM, UTIP, UTIA		SI	NORADRENALINA 1mg/ml. amp. x 4 ml.	Shock séptico. En nivel 3 solo en carro de emergencia para estabilización y derivación

02. SISTEMA CARDIOVASCULAR

ANTICOAGULANTES, PROTAMINA Y ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DEL USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
----------------------	-------------------------	--	----------------------------	---------------------	--------------	--

ANTICOAGULANTES PARENTERALES / HEPARINAS

3	SI	MG		SI	HEPARINA SODICA 5000 UI/ml. fco amp x 5 ml.	Profilaxis de enfermedad tromboembólica. Tratamiento del TEP severo y en IRC
4	SI	CM			ENOXAPARINA 20 mg jeringa prellenada	Anticoagulante para uso ambulatorio en trombosis venosas profundas, síndrome antifosfolipídico en embarazadas. Uso breve para pacientes anticoagulados de alto riesgo embólico que deben ser sometidos a procedimientos quirúrgicos. Angina inestable de alto riesgo. Uso con precaución en IRC. TEP
4	SI	CM			ENOXAPARINA 40 mg jeringa prellenada	
4	SI	CM			ENOXAPARINA 60 mg jeringa prellenada	
4	SI	CM			ENOXAPARINA 80 mg jeringa prellenada	

PROTAMINA

4		CM		SI	PROTAMINA SULFATO 1000 UI ampollas	Accidentes de anticoagulación con heparina sódica
---	--	----	--	----	---------------------------------------	---

02. SISTEMA CARDIOVASCULAR

ANTICOAGULANTES, PROTAMINA Y ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DEL USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
----------------------	-------------------------	--	----------------------------	---------------------	--------------	--

ANTICOAGULANTES ORALES

4		CAR, CM, PED, HEM			ACENOCUMAROL 1 mg comprimidos	TVP-TEP, FA crónica, Reemplazo Valvular mecánico, Trombofilias. Para evitar errores de prescripción y dispensación se sugiere tener en las farmacias listado de pacientes en tratamiento y almacenar en sitio seguro
4		CAR, CM, PED, HEM			ACENOCUMAROL 4 mg comprimidos	TVP-TEP, FA crónica, Reemplazo Valvular mecánico, Trombofilias. Para evitar errores de prescripción y dispensación se sugiere tener en las farmacias listado de pacientes en tratamiento y almacenar en sitio seguro

FÁRMACOS ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS

2		MG		SI	ASPIRINA 100 mg comprimidos	Prevención secundaria de enfermedad cardiovascular. No hay diferencias en efectividad con dosis entre 75 y 325 mg. Dosis mayores solo aumentan el riesgo de HDA
6	SI	CAR		SI	CLOPIDOGREL 75 mg comprimidos	Tratamiento limitado según patología: Post Angioplastia Coronaria con Stent común (3 meses) o stent liberador de drogas (12 meses), IAM con supra ST que recibe fibrinolíticos (1 mes), Angina Inestable de alto riesgo con cambios ECG o elevación enzimática (12 meses).

FIBRINOLÍTICOS

3		MG		SI	ESTREPTOQUINASA 1.500.000 UI fco. ampolla	IAM con supradesnivel del ST, TEP con descompensación hemodinámica. Consensuar cada caso con cardiología. No usar en empiema pleural. Requiere cadena de frío
		Unidad de Stroke (ER/ UTIA)	Hospitales con protocolos consensuados		ALTEPLASE	ACV isquémico agudo dentro de protocolo estricto (ventana menor a 3 horas, sin contraindicaciones, administración exclusiva en Terapia o Unidad de ACV).

02. SISTEMA CARDIOVASCULAR

ANTICOAGULANTES, PROTAMINA Y ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
----------------------	------------------------	--	----------------------------	---------------------	--------------	--

FÁRMACOS PARA EL TRATAMIENTO DEL DUCTUS ARTERIOSO

8		NEO, CardioPediátrica			INDOMETACINA 50mg frasco ampolla	En Neonatología para cierre del ductus y profilaxis de sangrado cerebral en menores de 1200gr
8*		Neo			ALPROSTADIL 500 mcg ampollas	Prostaglandina E1 de uso endovenoso en neonatología para promover la dilatación del ductus arterioso en neonatos con cardiopatía congénita dependiente del cortocircuito del ductus para su oxigenación/perfusión. En H. Chos Malal, San Martín y Zapala se autoriza disponer de un tratamiento para iniciar desde el diagnóstico hasta el traslado a nivel 8, sólo a cargo de profesional capacitado en ecocardiografía pediátrica. Requiere cadena de frío, uso con bomba de infusión.

FÁRMACOS PARA DIAGNÓSTICO EN PRUEBAS FUNCIONALES

8		CAR HPN			DIPIRIDAMOL ampollas	Estudio de isquemia miocárdica en pacientes con enfermedad coronaria mediante Ecocardiograma estrés
---	--	---------	--	--	-------------------------	---

03. ANTIINFECCIOSOS

(ANTIBACTERIANOS, ANTIPARASITARIOS, ANTIVIRALES, ANTIFÚNGICOS)

ANTIBACTERIANOS

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
----------------------	------------------------	--	----------------------------	---------------------	--------------	--

AMINOGLUCÓSIDOS

4		CM, PED, Terapias, INF			AMIKACINA 100 mg ampollas	Terapia de combinación en sospecha de infección por <i>Pseudomona</i> y otros Gram negativos. Neutropenia febril y Nebulizado para pacientes con FQ colonizados
4		CM, Terapias, INF			AMIKACINA 500 mg frasco ampolla	Terapia de combinación en sospecha de infección por <i>Pseudomona</i> y otros Gram negativos. Neutropenia febril
3		MG			GENTAMICINA 80 mg amp	Infección urinaria, terapia antibiótica combinada en infecciones intraabdominales, endocarditis, etc.

Gentamicina colirio (Ver Capítulo 13. OFTALMOLOGÍA, OTORRINOLARINGOLOGÍA Y ODONTOLOGÍA)

PENICILINAS

2		MG			PENICILINA BENZATÍNICA frasco ampolla 1.2 millUI.	Faringitis estreptocócica: * adultos: dosis única de 1,2 millones UI * niños (<27kg): 600.000 UI.
2		MG			PENICILINA BENZATÍNICA fco amp 2.4 millUI	Profilaxis fiebre reumática: 2,4 millones UI/mes. Sífilis primaria y latente temprana: 2,4 millones UI única dosis. Latente tardía 2,4 millones UI por tres semanas.
3		MG/LO			PENICILINA G SÓDICA 1 millUI fco amp	Infecciones por neumococo. Neurosífilis. Tratamiento empírico en combinación para cubrir diversos focos (abdomen, odontógeno, partes blandas, etc).

03. ANTIINFECCIOSOS

(ANTIBACTERIANOS,
ANTIPARASITARIOS, ANTIVIRALES,
ANTIFÚNGICOS)

ANTIBACTERIANOS

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
----------------------	------------------------	--	----------------------------	---------------------	--------------	--

AMINOPENICILINAS

2		MG, ODO			AMOXICILINA 250 mg/ml suspensión x 60 ml	Otitis Media Aguda, Adenoiditis, Faringitis pultácea estreptocócica, Neumonía, Sinusitis, Profilaxis esplenectomizados, infecciones odontógenas.
2		MG, ODO			AMOXICILINA 500 mg comprimidos	Infección respiratoria alta bacteriana, Neumonías, Sinusitis, Profilaxis esplenectomizados, infecciones odontógenas
3	SI	MG			AMPICILINA 1g frasco ampolla	Tratamiento empírico inicial de la Neumonía aguda de la comunidad de bajo riesgo en internación, Infecciones por neumococo y por Enterococo Sensible. Combinada con otros antibióticos para sepsis neonatal y tratamientos empíricos en infecciones abdominales, etc.

INHIBIDORES DE BETALACTAMASAS

2	SI	MG, ODO			AMOXICILINA 400 mg + CLAVULÁNICO, 5 mg/5 ml susp x 70 ml	Mordeduras, infecciones odontógenas, Neumonía en pacientes con comorbilidades
2	SI	MG			AMOXICILINA 825 mg + CLAVULÁNICO 125 mg comprimido	Mordeduras, infecciones odontógenas, Neumonía en pacientes con comorbilidades, EIP, Pie diabético
3	SI	MG			AMPICILINA 1gr + SULBACTAM 500 mg fco. ampolla	Tratamiento empírico inicial de la Neumonía aguda en pacientes con comorbilidades, Pie diabético, EIP, mordeduras, Infecciones urinarias complicadas.

03. ANTIINFECCIOSOS

(ANTIBACTERIANOS,
ANTIPARASITARIOS, ANTIVIRALES,
ANTIFÚNGICOS)

ANTIBACTERIANOS

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
----------------------	------------------------	--	----------------------------	---------------------	--------------	--

PENICILINAS ANTIPSEUDOMONAS

4	SI	CM, UTIA, NEO, PED			PIPERACILINA-TAZOBACTAM 1 g/ 0,5 g frasco ampolla	Neutropenia Febril / Neumonía intrahospitalaria
---	----	--------------------	--	--	---	---

ANTIBIÓTICOS GLUCOPÉPTIDOS

4		INF, CM, PED, NEO			VANCOMICINA 500 mg frasco ampolla	Infecciones por SAMR. Tratamiento empírico inicial solo en casos seleccionados como sepsis con sospecha de bacteriemia en paciente en diálisis
4		INF			TEICOPLANINA 200 mg frasco ampolla	Infecciones por cocos Gram positivos solo sensibles a glucopéptidos que podrán ser externados con Teicoplanina IM
8		INF			TEICOPLANINA 400 mg frasco ampolla	Infecciones por cocos Gram positivos solo sensibles a glucopéptidos que podrán ser externados con Teicoplanina IM

CEFALOSPORINAS DE 1° GENERACIÓN

2		MG			CEFADROXILO 250 mg/ 5ml suspensión x 60ml	Uso en pediatría. Infecciones cutáneas y de partes blandas, profilaxis y tratamiento de inf. Urinarias
2		MG, LO			CEFADROXILO 500 mg comprimidos	Infecciones cutáneas y de partes blandas, infecciones urinarias
3		MG			CEFAZOLINA 1 g frasco ampolla	Infecciones de piel y partes blandas. Bacteriemias por Staphylococcus Aureus Meticilino Sensible. Profilaxis quirúrgica

03. ANTIINFECCIOSOS

(ANTIBACTERIANOS,
ANTIPARASITARIOS, ANTIVIRALES,
ANTIFÚNGICOS)

ANTIBACTERIANOS

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
----------------------	------------------------	--	----------------------------	---------------------	--------------	--

CEFALOSPORINAS DE 3° GENERACIÓN

4		PED, NEO			CEFOTAXIMA 1 g frasco ampolla	Tratamiento de sepsis, meningitis. Restringir uso por resistencia bacteriana (Bacterias BLEE).
4		CM, PED			CEFTAZIDIMA 1 g frasco ampolla	Neutropenia febril / Infecciones por Pseudomonas. Restringir uso por resistencia bacteriana (Bacterias BLEE).
4	SI	MG, PED	VI		CEFTRIAJONA 1 g frasco ampolla	Manejo ambulatorio breve (24-48 hs) inicial de pielonefritis y neumonías de moderada severidad como alternativa para evitar la internación. Restringir uso por resistencia bacteriana (Bacterias BLEE).

OTROS BETA LACTÁMICOS - CARBAPENEM

4		CM, PED			IMIPENEM + CILASTATINA 500 mg fco amp IV	Infección por gérmenes multirresistentes. Está condicionada su dispensación a la presentación de informe bacteriológico o en su defecto una justificación clínica por escrito
4		UTIA, CM, INF, NEO, UTIP			MEROPENEM 500 / 1000 mg frasco ampolla IV	Tratamiento empírico inicial en infecciones graves en pacientes con estadía prolongada en UTIA y Fibroquísticos. Otros casos según Antibiograma y patrón de resistencia local. En lactantes se prefiere este antes que al Imipenem por menor riesgo de convulsiones.
8		INF			ERTAPENEM 1 gr liofilizado	Infecciones por gérmenes resistentes. Dosis 1 gr/día IM. Solo por autorización de Infectología cuando permita dar el alta a pacientes con infecciones solo sensibles a carbapenems.

TETRACICLINAS

3		MG			DOXICIDINA 100 mg comprimidos	Tratamiento de infecciones por Chlamydia, psitacosis, leptospirosis, ETS y EPI, rosácea.
---	--	----	--	--	---	--

03. ANTIINFECCIOSOS

(ANTIBACTERIANOS,
ANTIPARASITARIOS, ANTIVIRALES,
ANTIFÚNGICOS)

ANTIBACTERIANOS

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
----------------------	------------------------	--	----------------------------	---------------------	--------------	--

MACRÓLIDOS Y OTROS COMPUESTOS

2	SI	MG			AZITROMICINA 500 mg comprimidos	Plan Nacional VIH/Sida en profilaxis de MAC, abuso sexual, segunda línea en EIP y Coqueluche
8	SI	NEUPED			AZITROMICINA jarabe	Coqueluche – Fibrosis quística
2		MG			ERITROMICINA comprimidos	Coqueluche y Neumonías intersticiales en embarazadas.

ERITROMICINA COLIRIO Y UNGÜENTO

(Ver Capítulo 13 OFTALMOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA Y ODONTOLOGIA)

2	SI	MG			CLARITROMICINA 500 mg comprimidos	Neumonía / Coqueluche / Erradicación H. Pylory / Plan HIV
2	SI	MG			CLARITROMICINA suspensión 250 mg en 5 ml x 60 ml	Neumonía / Coqueluche
8		UTIA, UTIP, INF			CLARITROMICINA ampollas	Neumonía / Coqueluche graves internados en cuidados críticos

03. ANTIINFECCIOSOS

(ANTIBACTERIANOS,
ANTIPARASITARIOS, ANTIVIRALES,
ANTIFÚNGICOS)

ANTIBACTERIANOS

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
----------------------	------------------------	--	----------------------------	---------------------	--------------	--

CLINDAMICINA, METRONIDAZOL Y ORNIDAZOL

4		INF, CM			CLINDAMICINA 300 mg cápsulas	Toxoplasmosis Oftálmica Huesped sano-HIV. Plan HIV
4		GIN, TRA, QX, CM, PED			CLINDAMICINA 600 mg ampollas	Tratamiento de Infecciones por Gérmenes anaerobios y mixtas (EPI, miositis graves, flemones odontógenos y periamigdalinos) asociado a otros ATB
2		MG			METRONIDAZOL 125 mg/ml suspensión x 100 ml	Antibiótico con actividad anti anaerobios. Terapia combinada en focos odontógeno, abdominal, etc.
2		MG			METRONIDAZOL 500 mg comprimidos	Antibiótico con actividad anti anaerobios. Terapia combinada en focos odontógeno, abdominal, etc.
4		NEO			METRONIDAZOL 500 mg frasco ampolla x 100 ml	Antibiótico anti anaerobios. Foco odontógeno, abdominal. Infecciones por clostridium. Solo autorizado para Neonatología.
2		MG/LO			METRONIDAZOL óvulos	Vaginosis por trichomonas
4		CM, PED			ORNIDAZOL 1 g amp	Combinado con otros antibióticos para Infecciones polimicrobianas y por anaerobios en diversas localizaciones (intraabdominales, flemones odontógenos complicados, etc)

03. ANTIINFECCIOSOS

(ANTIBACTERIANOS,
ANTIPARASITARIOS, ANTIVIRALES,
ANTIFÚNGICOS)

ANTIBACTERIANOS

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
----------------------	------------------------	--	----------------------------	---------------------	--------------	--

FLUORQUINOLONAS

3		MG	VI		CIPROFLOXACINA 200 mg SACHET	Infección Urinaria Alta, Prostatitis, Gonorrea, Sepsis con foco abdominal
4		INF, NEU, NEF			CIPROFLOXACINA 50 mg/ml jarabe x 100 ml	Restringido a usos pediátricos donde no se puede usar otra droga, por los efectos adversos sobre cartilago de crecimiento
3		MG			CIPROFLOXACINA 500 mg comprimidos	Pielonefritis, prostatitis
2		MG			NORFLOXACINA 400 mg comprimido	Infecciones urinarias bajas (cistitis), profilaxis de PBE en pacientes con cirrosis

GLICILCICLINAS

8		INF			TIGERCICLINA frasco ampolla 50 mg	Infección por Staphylococcus MR, gérmenes susceptibles gram negativos y gram positivos.
---	--	-----	--	--	---	---

Oxazolidinona fluorada

8		INF			LINEZOLID 600 mg y comprimidos	Cocos gram positivos resistentes con antibiograma.
---	--	-----	--	--	--	--

03. ANTIINFECCIOSOS

(ANTIBACTERIANOS,
ANTIPARASITARIOS, ANTIVIRALES,
ANTIFÚNGICOS)

ANTIBACTERIANOS

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
----------------------	------------------------	--	----------------------------	---------------------	--------------	--

SULFONAMIDAS Y COMPUESTOS

2		MG			COTRIMOXAZOL (TMP/SMX) 400 mg / 80 mg comprimidos	Tratamiento de infecciones urinarias, prostatitis, sinusitis, infecciones osteoarticulares. No usar en embarazadas
4		PED, CM, INF			COTRIMOXAZOL (TMP/SMX) 800 mg/ 160 mg comp	PLan nacional VIH/SIDA profilaxis, neumonía por <i>Pneumocystis jirovecii</i> .
2		MG			COTRIMOXAZOL (TMP/SMX) suspensión x 60ml	Infecciones Urinarias, otras infecciones según antibiograma, profilaxis PCP en inmunosuprimidos. No usar en neonatos con hiperbilirrubinemia
6		CM, PED, INF, UTIA			COTRIMOXAZOL (TMP/SMX) 400-80 mg ampollas	Infecciones por <i>stafilococo</i> resistente, según antibiograma. Neumonía por <i>Pneumocystis jirovecii</i> en HIV con imposibilidad de utilizar la vía oral. Considerar stock mínimo para iniciar tratamiento en niveles IV alejados.

POLIMIXINAS

8		INF			COLISTINA 100 mg frasco ampolla	Restringido según Antibiograma
---	--	-----	--	--	---	--------------------------------

FURANTOÍNAS

2		MG			NITROFURANTOINA 100 mg cápsulas	Infección urinaria baja 100 mg c/ 12 hrs por 7 días. Profilaxis en infección urinaria baja recurrente 100 mg/día. No usar en pielonefritis. Contraindicación teórica en el embarazo
2		MG			NITROFURANTOINA 250 mg/ 5 ml suspensión	Infección urinaria baja

03. ANTIINFECCIOSOS

(ANTIBACTERIANOS,
ANTIPARASITARIOS, ANTIVIRALES,
ANTIFÚNGICOS)

ANTIBACTERIANOS

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
----------------------	------------------------	--	----------------------------	---------------------	--------------	--

COLIRIOS ANTIBIÓTICOS

(Ver Capítulo 13. OFTALMOLOGÍA, OTORRINOLARINGOLOGÍA Y ODONTOLOGÍA)

MEDICAMENTOS ANTITUBERCULOSOS

TDO : tratamiento directamente observado

2	SI	MG	TDO		ISONIAZIDA 100 mg comprimidos	Programa Nacional TBC. Quimioprofilaxis TBC. Coordinación y gestión en conjunto con programa provincial de TBC.
2	SI	MG	TDO		ISONIAZIDA 300 mg comprimidos	Programa Nacional TBC. Quimioprofilaxis TBC
2	SI	MG	TDO		RIFAMPICINA 1g suspensión x 50 ml	Plan Nacional TBC, profilaxis post exposición a meningitis por Meningococo o Haemophilus
2	SI	MG	TDO		RIFAMPICINA 300 mg cápsulas /comprimido	Plan Nacional TBC, profilaxis post exposición a meningitis por Meningococo o Haemophilus
2	SI	MG	TDO		RIFAMPICINA+ISONIAZIDA 300/150 mg comprimidos	Plan Nacional TBC. Coordinación y gestión en conjunto con programa provincial de TBC.
2	SI	MG	TDO		RIFAMPICINA+ISONIAZIDA +PIRAZINAMIDA 150/75/25 mg comp.	Plan Nacional TBC. Coordinación y gestión en conjunto con programa provincial de TBC.
2	SI	MG	TDO		PIRAZINAMIDA 250 mg comp	Plan Nacional de TBC
2	SI	MG	TDO		ETAMBUTOL 400 mg comprimidos	Plan Nacional TBC
2	SI	MG	TDO		ESTREPTOMICINA 1g frasco ampolla	Plan Nacional TBC
8	SI	INF			RIFAMPICINA 600 mg frasco ampolla	Tratamiento combinado en Infecciones bacterianas severas por cocos Gram + según Antibiograma

03. ANTIINFECCIOSOS

(ANTIBACTERIANOS, ANTIPARASITARIOS, ANTIVIRALES, ANTIFÚNGICOS)

MEDICAMENTOS LEPROSOS

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
8		INF		VI	TALIDOMIDA 50 / 100 mg comprimido	Se tramita con notificación a través de Infectología con programa Nacional
8		INF, DER			DAPSONA 100 mg comprimido	Usos Dermatología Penfingoide ampollosa Actinomicetoma, Lepra- Autoinmunitarias, VIH-SIDA

Ver Rifampicina cápsulas (en antituberculosos)

MEDICAMENTOS ANTIPARASITARIOS

2		MG	C2		ALBENDAZOL 400 mg comprimido	HIDATIDOSIS (requiere confección de planilla de notificación individual C2 para su dispensación), FASCIOLASIS , estrogiloidosis. Plan Nacional. Las coordinaciones zonales deben controlar que se complete la ficha C2/SNVS
2		MG			MEBENDAZOL 100 mg comprimido	Tratamiento de helmintos intestinales y anquilostomiasis.
2		MG			MEBENDAZOL 2% suspensión	Tratamiento de helmintos intestinales y anquilostomiasis
8		INF			PRAZIQUANTEL 600 mg comprimidos	Neurocisticercosis

ECTOPARASITICIDAS: PEDICULOSIS

2		MG			PERMETRINA 1% loción	Ovicida y pediculicida. Se aplica en cabello húmedo, enjuagando a los 10 minutos y realizando una segunda colocación a la semana 8 a los 15 días.
---	--	----	--	--	--------------------------------	---

03. ANTIINFECCIOSOS

(ANTIBACTERIANOS,
ANTIPARASITARIOS, ANTIVIRALES,
ANTIFÚNGICOS)

MEDICAMENTOS ANTIPARASITARIOS

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
----------------------	------------------------	--	----------------------------	---------------------	--------------	--

ESCABIOSIS

2		MG			PERMETRINA 5% crema fluida	Escabiosis: Puede usarse en todas las edades y en embarazadas. Aplicar luego de baño de inmersión. Retirar la loción a las 8 hrs. Los pacientes deben vestirse con ropa limpia y planchada. La ropa que no se pueda lavar, se guarda en bolsas cerradas durante 3-4 días. Repetir la aplicación a la quinta y décima noche.
---	--	----	--	--	--------------------------------------	---

ANTIMALÁRICOS

4		REU, CM, NEF, INF			CLOROQUINA 100 mg comprimidos	Artritis Reumatoidea, Lupus y otras colagenopatías. Malaria. Control oftalmológico periódico.
---	--	-------------------	--	--	---	---

LEISHMANIASIS Y TRIPANOSOMIASIS

4	SI	CM, INF			BENZNIDAZOL 100 mg comprimidos	Chagas Agudo y en algunos casos de Chagas Crónico, Alternativa a Nifurtimox. Plan Nacional Chagas
8		INF			PENTAMIDINA 300 mg frasco ampolla	Pneumocystis jirovecii en pacientes HIV alérgicos al TMP/SMX

TOXOPLASMOSIS

8		INF			PIRIMETAMINA 25 mg comprimidos	Toxoplasmosis. En HIV+ Plan Nacional de HIV-SIDA
8		INF			SULFADIAZINA 500 mg comprimido	Toxoplasmosis. Plan Nacional HIV.

Ver Cotrimoxazol comprimidos (en Sulfonamidas y compuestos)

ANTIAMEBIASIS Y ANTIGIARDIASIS

Ver Metronidazol (en Clindamicina, Metronidazol y Ornidazol)

PNEUMOCYSTIS CARINII

Ver Cotrimoxazol comprimidos (en Sulfonamidas y compuestos)

03. ANTIINFECCIOSOS

(ANTIBACTERIANOS,
ANTIPARASITARIOS, ANTIVIRALES,
ANTIFÚNGICOS)

ANTIVIRALES

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
----------------------	------------------------	--	----------------------------	---------------------	--------------	--

VIRUS DEL GRUPO HERPES Y VIRUS VARICELA ZOSTER

2		PED, MG			ACICLOVIR 400 mg/ 5 ml jarabe x 240 ml	Profilaxis y tratamiento Varicela / Herpes zóster
2	SI	MG, PED, CM			ACICLOVIR 800 mg comprimidos	Plan Nacional VIH/Sida, lesiones genitales por herpes y supresión en recurrencias, Varicela zóster, zóster oftálmico, herpes zóster en adultos e inmunocomprometidos, profilaxis en trasplantados. No aprobado para herpes labial, parálisis facial periférica ni neuralgia post-herpética.
4		UTIA, INF, CM, PED			ACICLOVIR 500 mg frasco ampolla	Meningoencefalitis por herpes, lesiones herpéticas graves en inmunocomprometidos
4		OFT			ACICLOVIR pomada oftálmica x 5 g	Lesiones oftálmicas por virus herpes
8		INF			GANCICLOVIR 500 mg ampollas	Plan Nac HIV/SIDA, infecciones por CMV primera línea
8		INF			FOSCARNET frasco ampolla	Plan Nac HIV/SIDA. Tratamiento de CMV segunda línea, cuando se contraindica el Ganciclovir por pancitopenia

03. ANTIINFECCIOSOS

(ANTIBACTERIANOS,
ANTIPARASITARIOS, ANTIVIRALES,
ANTIFÚNGICOS)

ANTIVIRALES

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
----------------------	------------------------	--	----------------------------	---------------------	--------------	--

VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA INHIBIDORES DE LA TRANSCRIPTASA REVERSA INHIBIDORES NUCLEOSIDOS DE LA TRANSCRIPTASA REVERSA

8		INF			ZIDOVDINA (AZT) ampolla	
8		INF			ZIDOVDINA (AZT) 10 mg/ml jarabe	
8		INF			LAMIVUDINA (3TC) 10 mg/ml jarabe	
8		INF			LAMIVUDINA (3TC) 150 mg comprimidos	
8		INF			ABACAVIR jarabe	
8		INF			TENOFOVIR comprimidos	
			PREVIA AUTORIZACIÓN		ETRAVIRINA	

03. ANTIINFECCIOSOS

(ANTIBACTERIANOS,
ANTIPARASITARIOS, ANTIVIRALES,
ANTIFÚNGICOS)

ANTIVIRALES

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
----------------------	------------------------	--	----------------------------	---------------------	--------------	--

INHIBIDORES NO NUCLEÓSIDOS DE LA TRANSCRIPTASA REVERSA

8		INF			NEVIRAPINA 200 mg comprimidos	
8		INF			NEVIRAPINA jarabe	
8		INF			EFAVIRENZ 200 mg cápsulas	

INHIBIDORES DE PROTEASA

8		INF			INDINAVIR 400 mg comprimidos	
8		INF			RITONAVIR 100 mg comprimidos	
8		INF			RITONAVIR 400 mg/ 5 ml jarabe	
8		INF			RITONAVIR + LOPINAVIR comprimido	

03. ANTIINFECCIOSOS

(ANTIBACTERIANOS,
ANTIPARASITARIOS, ANTIVIRALES,
ANTIFÚNGICOS)

ANTIVIRALES

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
----------------------	------------------------	--	----------------------------	---------------------	--------------	--

INHIBIDORES DE PROTEASA/ INTEGRASA

8		INF			RITONAVIR + LOPINAVIR <i>Suspensión x120 ml</i>	
8		INF			RALTEGRAVIR 400 mg	
8		INF			ATAZANAVIR <i>200 y 300 mg cápsula</i>	
8		INF			DOLUTEGRAVIR 50 mg DARUNAVIR TIPRANAVIR	

ASOCIACIONES

8		HEP, GAS, INF			EFAVIRENZ / EMTRICITABINA / TENOFOVIR	
---	--	---------------	--	--	--	--

03. ANTIINFECCIOSOS

(ANTIBACTERIANOS,
ANTIPARASITARIOS, ANTIVIRALES,
ANTIFÚNGICOS)

ANTIVIRALES

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
----------------------	------------------------	--	----------------------------	---------------------	--------------	--

ASOCIACIONES

8		INF			LAMIVUDINA / ABACAVIR 300/600 mg	
8		INF			DARUNAVIR 800 / RITONAVIR 100	
8		INF			DARUNAVIR 600 / RITONAVIR 100	
8		INF, HEP			TENOFOVIR / EMTRICITABINA 300/200 mg	
					TENOFOVIR / LAMIVUDINA 300/300 mg	
		I			ELVITEGRAVIR 150/ COBICISTAT 150/TENOFOVIR- ALAFENAMIDA 11,2/EMTRICITABINA 200	

NUEVAS DROGAS

8		INF			MARAVIROC	
---	--	-----	--	--	-----------	--

03. ANTIINFECCIOSOS

(ANTIBACTERIANOS,
ANTIPARASITARIOS, ANTIVIRALES,
ANTIFÚNGICOS)

ANTIVIRALES

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
----------------------	------------------------	--	----------------------------	---------------------	--------------	--

HEPATITIS VIRAL

8		HEPATO, GASTRO, INF			RIBAVIRINA 200 mg cápsula	HEPATITIS C (asociación)
8		INF, HEPATO			INTERFERON ALFA 2ª PEGILADO 180 mcg jeringa prellenada	HEPATITIS C
8		INF, HEPATO			SOFOSVIVIR 400 mg	
8		INF			DADATESVAVIR 30-60 mg	

03. ANTIINFECCIOSOS

(ANTIBACTERIANOS,
ANTIPARASITARIOS, ANTIVIRALES,
ANTIFÚNGICOS)

ANTIVIRALES

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
----------------------	------------------------	--	----------------------------	---------------------	--------------	--

Ver Lamiduvina (en Antiretrovirales)

MEDICAMENTOS ANTIFÚNGICOS

AZÓLICOS

2		MG			ITRACONAZOL 100 Comp	Onicomiosis en pacientes inmunocomprometidos. Infecciones en HIV. Control de hepatograma. Plan Nacional VIH/Sida
2	SI	MG			ITRACONAZOL 200 mg	Onicomiosis en pacientes inmunocomprometidos. Infecciones en HIV. Control de hepatograma. Plan Nacional VIH/Sida
4		CM			FLUCONAZOL 200 mg comp	Plan Nac HIV/SIDA. Candidiasis oral-digestiva-genital. Profilaxis trasplante.
4		PED			FLUCONAZOL (suspensión oral) 50 mg/ 5ml	Candidiasis
8		CM			FLUCONAZOL 200 mg/ 100 ml. fco amp.	Candidiasis Sistémica grave con Insuficiencia renal
2		MG			MICONAZOL crema dérmica x 30 gramos	Micosis interdigital y en pliegues

ALILAMINAS

2		MG			GRISEOFULVINA 500 mg cápsula	Tratamiento de tiñas.
---	--	----	--	--	--	-----------------------

03. ANTIINFECCIOSOS

(ANTIBACTERIANOS,
ANTIPARASITARIOS, ANTIVIRALES,
ANTIFÚNGICOS)

ANTIFÚNGICOS

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
----------------------	------------------------	--	----------------------------	---------------------	--------------	--

POLIENOS

6	SI	CM, PED, UTIA			ANFOTERICINA 50 mg frasco ampolla	<i>Micosis Sistémica Grave-Neutrópico febril</i>
2		MG/LO			NISTATINA 100000 UI tabletas vaginales	<i>vaginosis por candida</i>
2		MG			NISTATINA 500000 UI/ 5 ml. suspensión	<i>Candidiasis orofaríngeas</i>
6	SI	CM, PED, UTIA, NEO			ANFOTERICINA 50 mg frasco ampolla	<i>Micosis Sistémica Grave-Neutrópico febril</i>
8		CM, INF			ANFOTERICINA LIPOSOMAL	<i>Micosis Sistémica Grave- Neutropenia febril con insuficiencia renal</i>
8		CM, INF			VORICONAZOL 200mg comprimido	<i>Neutropenia febril</i>
8		CM, INF			VORICONAZOL 200mg ampolla	<i>Neutropenia febril</i>

04. ANALGÉSICOS OPIOIDES

FÁRMACOS HIPNOANALGÉSICOS

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
3		MG	Ley Nacional de estupefacientes N° 23737	SI	MORFINA CLORHIDRATO 10 mg ampollas	Analgésico opiode. Tratamiento del dolor
3		MG	Ley Nacional de estupefacientes N° 23737		MORFINA A jarabe 0,2% suspensión	Analgésico opiode. Tratamiento del dolor, Antitusivo
3		MG	Ley Nacional de estupefacientes N° 23737		MORFINA A Gotas 1-2 %	Analgésico opiode. Tratamiento del dolor, Antitusivo
3		MG	Ley Nacional de estupefacientes N° 23737		MORFINA SULFATO 30 mg comprimidos	Analgésico opiode. Tratamiento del dolor. Paliativos. Quemados. Antitusivo
3		MG	Ley Nacional de estupefacientes N° 23737		MEPERIDINA 100 mg ampollas	Opiáceo para tratamiento del dolor

04. ANALGÉSICOS OPIOIDES

FÁRMACOS HIPNOANALGÉSICOS

NIVEL DE COMPL E- JIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMERA PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
4		MG	Ley Nacional de estupefacientes N° 23737		TRAMADOL 100 mg/ml gotas	Uso en tratamiento del dolor y Cuidados Paliativos
4		MG	Ley Nacional de estupefacientes N° 23737		TRAMADOL comprimidos 50 mg	Analgésico opiáceo
4		CM, UTIA, Adicciones, PAL	Ley Nacional de estupefacientes N° 23737		METADONA	Cuidados paliativos en dolor refractario a altas dosis de morfina, Deshabitación al uso crónico de opiáceos
3		MG	Ley Nacional de estupefacientes N° 23737	SI	FENTANILO 0,05 mg/ml amp. x 5 ml.	Analgésico opiáceo. En intubación orotraqueal. Dosis 1-3 microgr/Kg. Para analgesia reglada solo en UTIA.

5. ANALGÉSICOS NO OPIODES CORTICOSTEROIDES ANTIRREUMÁTICOS

ANALGÉSICOS Y ANTIPIRÉTICOS

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD PARA REALIZAR PRESCRIPCIÓN	HABILITADA LA PRIMER	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
2		MG			SI	ASPIRINA 100mg	Prevención secundaria de enfermedad cardiovascular. No hay diferencias en efectividad con dosis entre 75 y 325 mg. Dosis mayores solo aumentan el riesgo de HDA
2		MG/LO				PARACETAMOL 500 mg comprimido	Analgésico, antitérmico
2		MG				PARACETAMOL 10% gotas 20 ml	Analgésico, antitérmico. Sólo en lactantes donde existen controversias sobre la seguridad de la dipirona

ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS (AINE) Y COMPUESTOS

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD PARA REALIZAR PRESCRIPCIÓN	HABILITADA LA PRIMER	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
2		MG				IBUPROFENO 20 mg/ml. jarabe x 200 ml.	Analgesico, antiinflamatorio y antipirético en pacientes pediátricos
2		MG				IBUPROFENO 400 mg comp	Analgesico y anti-inflamatorio. Riesgo de HDA dosis dependiente.

5. ANALGÉSICOS NO OPIOIDES CORTICOSTEROIDES Y

ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS (AINE) Y COMPUESTOS

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD PARA REALIZAR PRESCRIPCIÓN	HABILITADA LA PRIMER	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
2			MG			IBUPROFENO ampollas	
3			MG			DICLOFENAC 75 mg, ampollas IV	Antiinflamatorio- analgésico. Riesgo de HDA
2			MG, PED			DIPIRONA jarabe al 5% x 70ml	Analgésico, antitérmico
2			MG, PED			DIPIRONA 1 gramo ampollas	Analgésico, antitérmico
2			MG, PED			DIPIRONA 500mg, comprimidos	Uso como analgésico, antitérmico
4			OBST			INDOMETACINA supositorios	Amenaza de parto prematuro en embarazo menor de 32 semanas

FÁRMACOS PARA EL TRATAMIENTO Y PROFILAXIS DE LA MIGRAÑA

Aspirina (ver Analgésicos y antipiréticos) Paracetamol (ver Analgésicos y antipiréticos)

Propranolol (ver Capítulo 2 Cardiovascular. Bloqueantes adrenérgicos) Amitriptilina (ver Fármacos para el dolor neuropático)

Topiramato (Ver Capítulo 10 Sistema Nervioso Central)

FÁRMACOS PARA EL DOLOR NEUROPÁTICO

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD PARA REALIZAR PRESCRIPCIÓN	HABILITADA LA PRIMER	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
4			MG			AMITRIPTILINA 25 mg comprimidos	Dolor neuropático. Cuidados Paliativos Fibromialgia/profilaxis de migraña. Depresión.
4			MG			IMIPRAMINA 25 mg comprimidos	Dolor neuropático. Cuidados Paliativos Fibromialgia/profilaxis de migraña. Depresión.

Carbamacepina (Ver Capítulo 10 Sistema Nervioso Central. Anticonvulsivantes)

ANTIINFLAMATORIOS ESTEROIDEOS CORTICOSTEROIDES

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD PARA REALIZAR PRESCRIPCIÓN	HABILITADA LA PRIMER	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
2			MG, OFTALMO			DEXAMETASONA COLIRIO	Corticoide uso tópico en conjuntivitis alérgica. Uso corto
8			HEMATO			DEXAMETASONA 8 mg comprimidos	Oncohematología Mieloma, Leucemia, endocrinología test de supresión

ANTIINFLAMATORIOS ESTEROIDEOS CORTICOSTEROIDES

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD PARA REALIZAR PRESCRIPCIÓN	HABILITADA LA PRIMER	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
8		HEMATO				DEXAMETASONA 40mg comprimidos	Oncohematología Mieloma, Leucemia
4		MG			SI	DEXAMETASONA 4mg/ml frasco ampolla x 2 ml	Meningitis bacteriana y por TBC, vómitos en quimioterapia, edema cerebral no traumático, prueba de supresión en diagnóstico de Enf de Cushing
4		CM, PED				HIDROCORTISONA 10 mg comp	Insuf suprarrenal 1° - 2°. Se recomienda consulta con Endocrinología
2		MG			SI	HIDROCORTISONA 100 mg fco. amp.	Anafilaxia, alergia, crisis asmática aguda
3	SI	MG				BETAMETASONA FOSFATO + ACETATO 3 ml amp.	Maduración pulmonar en amenaza de parto prematuro, Infiltraciones articulares. No autorizado en lumbalgias ni ciatálgias

ANTIINFLAMATORIOS ESTEROIDEOS CORTICOSTEROIDES

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD PARA REALIZAR LA PRESCRIPCIÓN	HABILITADA LA PRIMER	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
2			MG			BETAMETILPREDNISONA 8 mg comprimidos	Uso en Oncohematología, Inmunosupresión, Asma, EPOC, Enf. Reumáticas.
2			MG			BETAMETILPREDNISONA 40 mg comprimidos	Uso en Oncohematología, Inmunosupresión, Asma, EPOC, Enf. Reumáticas.
4		Qx dermato				TRIAMSINOLONA frasco ampollas 40 mg	Queloides
2			MG			BETAMETILPREDNISONA gotas	Uso en pediatría para Oncohematología, Inmunosupresión, Asma, EPOC, Enf. Reumáticas.
4			MG		SI	METILPREDSINOLONA 500 mg frasco ampolla	Pulsos de inmunosupresión en collagenopatías. Uso precoz en Trauma raquimedular cerrado: dosis bolo 30mg/kg ev en 15 minutos, seguido de mantenimiento a 5.4 mg/kg por hora infundido en 23 horas.

BETAMETASONA CREMA (Ver más abajo en FÁRMACOS PARA PATOLOGÍA DERMATOLÓGICA)

HIDROCORTISONA CREMA (Ver más abajo en FÁRMACOS PARA PATOLOGÍA DERMATOLÓGICA)

OTROS FÁRMACOS ANTIRREUMÁTICOS
FÁRMACOS MODIFICADORES DE LA ENFERMEDAD REUMÁTICA
Cloroquina (Ver Antimaláricos, Capítulo 3 Antiinfecciosos)

INMUNOSUPRESORES

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD PARA REALIZAR LA PRESCRIPCIÓN	HABILITADA LA PRIMER	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
4		CM, REUMATO				METOTREXATO 7,5 y 2,5 mg comprimidos ranurados	Enfermedades autoinmunes. Primera línea en Artritis Reumatoidea
8		Reumato, CM		Con dictamen en CM		LEFLUNAMIDA 20 mg comp	Artritis reumatoidea, intolerancia a MTX y sulfazalasina
4		CM, REUMATO, ONCO				AZATIOPRINA 50 mg comprimidos	Uso Oncológico e inmunosupresor
8		ONCO/HEMATO/NEFRO				CICLOSPORINA microemulsión 100 mg/ml x 50 ml	Inmunosupresor. Uso en Transplantados
8		ONCO/HEMATO/NEFRO				CICLOSPORINA microemulsión preconcentrada 100 mg cápsula	Inmunosupresor. Uso en Transplantados

INMUNOSUPRESORES

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD PARA REALIZAR LA PRESCRIPCIÓN	HABILITADA LA PRIMER	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
8		ONCO/HEMATO/NEFRO				CICLOSPORINA microemulsión preconcentrada 25 mg cáps.	Immunosupresor. Uso en Transplantados
8		NEFRO, REUMATO				MICOFENOLATO 500 mg comprimidos	Immunosupresor. Uso en Transplantados
8		NEFRO, CARDIO				TACROLIMUS 1 mg comprimidos	Immunosupresor. Uso en Transplantados
8		NEFRO, CARDIO				TACROLIMUS 5 mg comprimidos	Immunosupresor. Uso en Transplantados

FÁRMACOS ANTIGOTOSOS

4		CM, REUMATO				COLCHICINA 1mg comprimidos	Crisis de Gota aguda. Dosis inicial 1 mg. Repetir dosis en 1-2 hrs si el dolor persiste. Dosis máxima 2 mg en 24 hrs. No superar la dosis máxima de 6 mg/total en 96 hrs. Estrecho margen terapéutico. Ante sobredosis los síntomas iniciales son digestivos, luego puede provocar fallo multiorgánico.
---	--	-------------	--	--	--	--------------------------------------	---

INMUNOSUPRESORES

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD PARA REALIZAR LA PRESCRIPCIÓN	HABILITADA LA PRIMER	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
2			MG			ALLOPURINOL 300 mg comprimidos	Hiperuricemia con antecedente de gota, litiasis renal.

FÁRMACOS PARA PATOLOGÍAS DERMATOLÓGICAS

4		DERMATO, CM				VASELINA SALICILADA 10% envase x 250g	Psoriasis
3			MG			VASELINA sólida pote X 200 g	Protector para dermatopatías
2			MG			AGUA D'ALIBOUR 50 ml	Uso tópico en Impétigo, dermatitis, eczemas y lesiones exudativas. Fórmula: Sulfato de cobre pentahidrato, Sulfato de zinc heptahidrato, Alcanfor racémico, Etanol 96% y Agua.
2			MG			PASTA AL AGUA potes X 40 GR. Preparación magistral	Dermatitis del pañal

FÁRMACOS PARA PATOLOGÍAS DERMATOLÓGICAS

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD PARA REALIZAR LA PRESCRIPCIÓN	HABILITADA LA PRIMER	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
4		DERMATO				HIDROCORTISONA 0,5% crema	Lesiones dérmicas que requieren corticoides en áreas de rostro, genitales o en niños
2		MG				BETAMETASONA 0,05% crema	Eccemas atópicos, Lesiones inflamatorias, Profilaxis de Cicatriz Queloidea
2		MG, GINECO				NITRATO DE PLATA BARRAS POR 4 GR	Caustico para eliminar lesiones (Verrugas cutáneas, lesiones papilomatosas, etc).
4		CIRUGIA, CM, PED				Emulsión Vitamina A Humectante Dosis de 100.000 UI	Quemados, lesiones dérmicas severas similares (stevens-Johnson, etc).
2		MG				SULFADIAZINA DE PLATA pomada x 400g	Uso en quemados
8		CX PLASTICA				TALCO DE POLIMIXINA	Uso exclusivo en pacientes quemados
6		DERMATO		CI y receta duplicada. VI		ISOTRETINOINA 20mg comprimidos	Acné nódulo quístico severo con consentimiento informado, test de embarazo negativo antes del inicio, y mensualmente, uso de doble método anticonceptivo. Teratogenicidad en 50% de los embarazos. Efectos adversos mucocutáneos frecuentes, hipertrigliceridemia, pancreatitis y hepatotoxicidad. Disposición A.N.M.A.T 6083/09.

FÁRMACOS PARA PATOLOGÍAS DERMATOLÓGICAS

2		MG, GIN			IMIQUIMOD 0,5%	Para verrugas genitales
4		CX			COLAGENASA 60 U.I.; CLORANFENICOL 1.00g. Unguento	Quemaduras de hasta un máximo de 10% de superficie corporal tipo AB. Lesiones necroticas cronicas, pie diabetico, ulceras cronicas
2		MG			PEROXIDO BENZOILO 2,5%, 5% y 10%	Tratamiento tópico del acné. Primer escalón farmacológico

Antibióticos (Ver capítulo 3 ANTIINFECCIOSOS)

Permetrina al 1% y al 5% (Ver Capítulo 3 ANTIINFECCIOSOS)

Miconazol crema (Ver Capítulo 3 ANTIINFECCIOSOS)

6. FÁRMACOS CON ACCIÓN METABÓLICA

VITAMINAS

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
3		MG		SI	VITAMINA B1 (TIAMINA) 100 mg ampollas	Intoxicación Alcohólica Aguda y encefalopatía alcohólica. Tratamiento inicial de status epiléptico
2		MG			VITAMINA B1 (TIAMINA) 300 mg ampollas	Desnutrición, alcoholismo
4		CM			VITAMINA B1, B2, B6, B12 comprimidos	Hipovitaminosis Clínica (anemia megaloblástica, demencia) con constatación por laboratorio.
8		NEO, PED			VITAMINA E (alfatocoferol) 200 UI cápsulas	
2	SI	MG, PED			Polivitamínico c/ Flúor gotas	Guía del menor
4		MG, CM, PED			Polivitamínico c/ Minerales gotas	Alimentación enteral en pacientes con déficit.

Vitamina D (Ver Fármacos que afectan el metabolismo óseo)

FÁRMACOS QUE AFECTAN EL METABOLISMO ÓSEO

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
2	SI	MG			VITAMINA D 10.000 UI gotas x 15 ml	Déficit de Vitamina D
4		CM			ERGOCALCIFEROL 1-25 0,25 mcg comprimidos	Insuficiencia renal crónica, raquitismo
4	SI	CM,GIN,NEF			ALENDRONATO 70 mg Comprimidos	Osteoporosis 1°-2°/Mieloma Múltiple
4		ONC, CM			PAMIDRONATO 90 mg ampollas	Osteoporosis por metástasis óseas por Mieloma Múltiple y cáncer de Mama

Estrógenos y estrógenos conjugados (Ver Capítulo 9 Sistema Endócrino) Calcio (Ver Sales, Minerales y Soluciones Hidroelectrolíticas)

FÁRMACOS QUE AFECTAN EL METABOLISMO DE LOS LÍPIDOS

2		MG			ATORVASTATINA 10 mg comprimidos	Hipercolesterolemia. Evidencia de efectividad en prevención secundaria
2		MG			GEMFIBROZIL 600mg comp	Hipertrigliceridemia. Control de miositis y de función hepática

FÁRMACOS QUE AFECTAN EL METABOLISMO DE LOS HIDRATOS DE CARBONO (ANTIDIABÉTICOS).

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
2	SI	MG		SI	INSULINA CORRIENTE Humana 100 UI/ml. fco amp x10ml.	Correcciones de glucemia
2	SI	MG			INSULINA NPH Humana 100 UI/ml. fco amp x10ml.	Diabetes tipo 1 y tipo 2 insulino-requiriente en dos o tres dosis/día

HIPO Y EUGLUCEMIANTES

2	SI	MG			GLICAZIDA 5 mg comp	DBT tipo 2. Reemplaza a glibenclamida por menor riesgo de hipoglucemia.
2	SI	MG			METFORMINA 850 mg comprimidos	DBT tipo 2. Precaución en ICC, disfunción hepática

PREPARADOS PARA NUTRICIÓN PARENTERAL

8		Terapias Intensivas	SI		Alimentación parenteral bolsa tres en uno	Pacientes críticos con contraindicación para alimentación enteral. Para otras indicaciones y/o por otras especialidades evaluación de pedido con HC
---	--	---------------------	----	--	--	---

ADITIVOS PARA NUTRICIÓN PARENTERAL (MINERALES Y OLIGOELEMENTOS)

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
8		UTI, NEO			ZINC SULFATO 1% ampollas	Complemento en alimentación parenteral prolongada
8		UTI, NEO	VI		COBRE SULFATO 2,4% amp.	Complemento en alimentación parenteral prolongada
8		Terapias Intensivas			Polivitamínico c/ Fólico+ minerales, ampolla	Complemento en alimentación parenteral prolongada

SULFATO DE MAGNESIO (Ver Sales, Minerales y Soluciones Hidroelectrolíticas) FOSFATO DE POTASIO (Ver Sales, Minerales y Soluciones Hidroelectrolíticas) GLUCONATO DE CALCIO (Ver Sales, Minerales y Soluciones Hidroelectrolíticas)

SALES, MINERALES Y SOLUCIONES HIDROELECTROLÍTICAS

2		MG/LO		SI	SOLUCIÓN FISIOLÓGICA sachet x 500 ml	Hidratación parenteral
3		MG,CM,PED		SI	CLORURO DE SODIO 20% ampollas x 20 ml	Preparación de soluciones en tratamiento de la hiponatremia. Nebulización para obtener muestras de esputo
4		MG, PED		SI	CLORURO DE POTASIO 1 M ampollas x 100	Reposición de hipokalemia grave. Uso restringido a control por ionograma. Tomar precauciones para evitar administración accidental.

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD PARA REALIZAR PRESCRIPCIÓN	HABILITADA LA PRIMERA	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
4		CM, PED				GLUCONATO DE POTASIO jarabex 150ml	Reposición de hipokalemia vía oral. Uso restringido a control por ionograma
8		NEF				ACETATO DE CALCIO 677 mg comprimidos	Quelante de fósforo
4		MG				CARBONATO DE CALCIO 1250 mg comprimidos	Osteoporosis, hipocalcemia, trastornos de paratohormonas
3		MG			SI	GLUCONATO DE CALCIO 10% ampollas x 10 ml	Hipocalcemia sintomáticas, hiperkalemia
3	SI	MG			SI	SULFATO de MAGNESIO 25 ó 50% ampollas x 10 ml	Eclampsia, Antiarrítmico, reposición en hipomagnesemias
8		UTI, NEO				FOSFATO MONOPOTASICO x 25ml. fco-amp	Reposición de hipofosfatemia
4		CM				FOSFATO Y SULFATO DE SODIO solución oral	PREPARACIÓN FIBRICOLOGOSCOPIA
2		MG			SI	AGUA BIDEUTILADA ampollas x 5ml	Dilución de fármacos
2		MG			SI	AGUA BIDEUTILADA ampollas x 10 ml	Dilución de fármacos

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD PARA REALIZAR LA PRESCRIPCIÓN	HABILITADA LA PRIMER	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
8		FAR				Solución fisiológica doble pico, doble bolsa, sachets x 250 m, 500ml	Insumo utilizado para la preparación de soluciones parenterales

FÁRMACOS ALCALINIZANTES DE ORINA

4		CM, PED, UTIA			SI	BICARBONATO de SODIO 1M x 100ml	Cetoacidosis con PH < 6,9. Alcalinización para quimioterapia
8		CM, NEF			SI	CITRATO DE POTASIO sobres x 3 gramos	Acidosis Tubular renal

ADSORBENTE PARA EL TRATAMIENTO DE LA HIPERKALEMIA

4		CM, NEF				POLIESTIRENO SULFATO DE CALCIO polvo x 100 gr	Hiperkalemia en IRC. Control estricto de ionograma
---	--	---------	--	--	--	--	--

HIDRATOS DE CARBONO

2		MG/LO			SI	DEXTROSA 5% sachet x 500 ml	Hidratación parenteral
---	--	-------	--	--	----	---------------------------------------	------------------------

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
3		MG		SI	DEXTROSA 10% sachet x 500ml	Tratamiento de la hipoglucemia
4		MG		SI	DEXTROSA 25% sachet x 500ml	Tratamiento de la hipoglucemia
2		MG		SI	DEXTROSA 25% sachet x 10ml	Hipertónico en tratamiento de hipoglucemia y manejo inicial del paciente en coma o con status epiléptico
8		FAR		SI	DEXTROSA 5% doble pico, doble bolsa, sachet x 100ml	Insumo utilizado para la preparación de soluciones parenterales
8		FAR		SI	DEXTROSA 5% doble pico, doble bolsa, sachet x 500ml	Insumo utilizado para la preparación de soluciones parenterales

SOLUCIONES PARA DIÁLISIS

8		NEFRO			Concentrado para bicarbonato serie Violeta tipo c50 (con glucosa)
8		NEFRO			Concentrado tipo c42

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD PARA REALIZAR LA PRESCRIPCIÓN	HABILITADA LA PRIMERA PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
8		NEFRO				Concentrado para bicarbonato serie Violeta tipo c41 (sin glucosa)	

7. MEDICAMENTOS QUE AFECTAN EL SISTEMA GASTROINTESTINAL

ANTIESPASMÓDICOS, ALTERADORES DE LA MOTILIDAD Y ANTIACIDOS ANTIMUSCARINICOS

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD PARA REALIZAR LA PRESCRIPCIÓN	HABILITADA LA PRIMER	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
2			MG			BUTILESCOPOLAMINA 10 mg comprimidos	Dolores cólicos
2			MG			BUTILHIOSCINA METILBROMUR ○ 20 mg amp	Dolores cólicos y estudios radiológicos

ALTERADORES DE LA MOTILIDAD

2			MG/LO			METOCLOPRAMIDA 10 mg ampollas	Antiemético
2			MG			METOCLOPRAMIDA 10 mg comprimidos	Antiemético
4			CM, PED			DOMPERIDONA 1% gotas x 20ml	Reflujo gastroesofágico, antiemético, sin efecto prokinético. EA: Riesgo cardiovascular en uso prolongado.

ANTIDIARREICOS Y ADSORBENTES INTESTINALES

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
2		MG			SALES de REHIDRATACION ORAL sobres	Reposición hidroelectrolítica en diarrea
4		PED			LOPERAMIDA 0,2 g/100 ml gotas x 10 ml	Diarreas crónicas de causa no infecciosa en pacientes con HIV, intestino corto, colitis actínica
4		CM			LOPERAMIDA 2 mg comprimidos	Diarreas crónicas de causa no infecciosa en pacientes con HIV, intestino corto, colitis actínica

Carbón Activado (Ver Capítulo 20 Emergencias Toxicológicas)

LAXANTES ESTIMULANTES

4	SI	MG			PICOSULFATO DE SODIO gotas 7,5 mg/ml 50 ml	Constipación por uso de opiáceos
---	----	----	--	--	--	----------------------------------

ABLANDADORES FECALES

2		MG/LO			Vaselina líquida	Constipación refractaria a medidas no farmacológicas
---	--	-------	--	--	------------------	--

LAXANTES OSMÓTICOS

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
2	Ver Hidróxido de Magnesio en Capítulo 20 "Toxicología"	MG/LO			LACTULOSA jarabe x200 ml	Encefalopatía hepática. Constipación refractaria a medidas no farmacológicas

MEDICAMENTOS ANTIULCEROSOS ANTAGONISTAS RECEPTORES H2

3	SI	MG			RANITIDINA 50 mg ampollas	HDA NO VARICEAL. Profilaxis úlcera de stress sólo en pacientes de alto riesgo. Uso exclusivo en internación hospitalaria
2		MG			RANITIDINA 150 mg comp	Tratamiento abreviado de gastritis
4		PED			RANITIDINA 150 mg/100 ml susp. envases de 120 cc	tratamientos crónicos con altas dosis de AINES y corticoides

INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
4	SI	CM			OMEPRAZOL 20 MG caps o comp.	HDA por úlcera péptica confirmada por FEDA.. Tratamiento de erradicación del Helicobacter Pilory. Esofagitis y reflujo.
4	SI	CM			OMEPRAZOL ampollas	HDA por úlcera péptica confirmada por FEDA, cuando está contraindicada la vía enteral

MEDICAMENTOS ANTIEMÉTICOS

METOCLOPRAMIDA (Ver alteradores de la motilidad)

6		ONC, CM			ONDANSETRON 8 mg ampolla	Vomitos incoercibles en pacientes oncológicos en quimioterapia. Segunda línea en paciente refractarios a metoclopramida. Según Protocolo: En náuseas y vómitos en post operatorio
---	--	---------	--	--	------------------------------------	--

TRASTORNOS INTESTINALES CRÓNICOS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS INTESTINALES

4		GAS, CM			SALAZOSULFAPIRIDINA 500 mg comprimidos	Enf Inflammatoria Intestinal
4		CM			MESALAZINA 400 mgo 500 mg comprimidos	Enfermedad inflamatoria intestinal

MERCAPTOPURINA (Ver Capítulo 18 Antineoplásicos)

FÁRMACOS PARA LA HEMORRAGIA DIGESTIVA VARICEAL

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
4	SI	CM		SI	OCTREOTRIDO 1 mg/5 ml.fco	HDA de origen variceal. Guía de Hemorragia digestiva alta.
6		END			HIDROXIPOLIETOXIDO DECANO (AET) 3%amp	Esclerosis vascular Esofagica por vía endoscópica

PROPRANOLOL (Ver Capítulo 2 CARDIOVASCULAR)

OTROS FÁRMACOS

2		MG/LO			HIDROXIDO ALUMINIO MAGNESIO 400/400mg/ 5ml. susp x 120 ml.	Dispepsia en embarazadas
4		MG			ACIDO URSODEOXI- COLICO 300mg comp ranurado	Colestasis del embarazo - Cirrosis biliar primaria
8		PED, NEO			ACIDO URSODEOXI- COLICO 150mg comp ranurado	Nutrición parenteral prolongada en neonatología y pediatría - Cuadros colestáticos por FQ, atresia de vías biliares, hepatitis autoinmune
4		CM,HEP			COLESTIRAMINA 4 g sobres	Prurito en trastornos hepáticos. No usar en embarazadas

8. SANGRE

ANTIANÉMICOS ANEMIAS POR DEFICIENCIA DE HIERRO

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
2		MG/LO			SULFATO FERROSO 200 mg comprimido	Anemia ferropénica.
2	SI	MG			SULFATO FERROSO 125 mg/ml. X 30 ml. Gotas	Profilaxis de anemia ferropénica en pediatría según Guía del menor.
2		MG			POLIMALTO SATO FERROSO INTRAMUSCULAR	Intolerancia al Hierro vía oral
8		NEF, HEM HEMOT, CM			SACARATO FERROSO ENDOVENOSO	Anemia ferropénica en pacientes en diálisis e IRC. Terminal. Alternativa válida ante anemia ferropénica más: intolerancia oral, mala absorción, hospitalización con acceso IV colocado por otro motivo, anticoagulación y urgencia relativa por aumentar masa eritrocitaria.

ANEMIAS MEGALOBLÁSTICAS

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
4		HEMATO, CM, PED			CIANOCOBALAMINA 10.000 UI ampollas	Anemia megaloblástica por déficit confirmado de vit. B12
2	SI	MG/LO			ACIDO FOLICO 1 mg comprimidos	Mujeres en edad fértil y embarazadas, anemia por déficit, malabsorción intestinal, pacientes pediátricos desnutridos crónicos
4	SI	CM, Hemato			ACIDO FOLICO 5 mg comprimidos	Rescate semanal en pacientes tratados con Metotrexate. Planificación familiar en mujeres con antecedente de defectos de cierre del tubo neural

ANEMIA DE LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA Y OTRAS ANEMIAS HIPOPROLIFERATIVAS

8		NEF, HEM			ERITROPOYETINA 2.000 UI frasco ampolla	Renales en diálisis, anemia de IRC y algunos hematológicos
---	--	----------	--	--	--	--

FACTORES DE LA COAGULACIÓN

6		HEM, Médico capacitado en hemoterapia			CONCENTRADO DE FACTORES DE COAGULACION VIT. K DEPENDIENTES (II, VII, IX, X) frasco ampolla	Reversion de trastornos de coagulación relacionado a deficit de factores K dependientes.
---	--	---------------------------------------	--	--	---	--

LAXANTES OSMÓTICOS

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
8		HEM			FACTOR VII HUMANO 500 UI frasco ampolla	Hemofilia
8		HEM			FACTOR VIII HUMANO 500 UI frasco ampolla	Hemofilia
8		HEM			FACTOR IX HUMANO 500 UI frasco ampolla	Hemofilia
3		MG		SI	VITAMINA K (Fitomenadion a) 10 mg ampollas	Corrección de errores de anticoagulación oral. Trastorno de Coagulación en insuficiencia hepática y malabsorción.
3		MG			VITAMINA KI (Fitomenadion a) 1 mg ampollas	Profilaxis en Recien Nacido
3	SI	OyT, UTIA, ER			ACIDO TRANEXAMICO fco amp 1 g/10 ml	Resolución de sangrado perioperatorio de cx de cadera, rodilla y columna. Politrauma con sangrado activo dentro de las 3 hs. HPP dentro de las 3 hs.

SUSTITUTOS Y EXPANSORES PLASMÁTICOS

4		CM, QX, AN, UTIA		SI	POLIGELINA 3,5% frasco 500ml	Uso en shock hipovolémico: Evidencia de falta de beneficio comparado con solución fisiológica. Plan de restricción progresiva de su uso.
---	--	------------------	--	----	--	--

SUSTITUTOS Y EXPANSORES PLASMÁTICOS

NIVEL DE COMPL E- JIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
4	SI	UTIA, CM, PED		SI	RINGER LACTATO sachet x 500ml	Uso restringido para corregir depleción salina en pacientes quemados, traumatizados, intraoperatorios. En shock no demostró ser superior a S. Fisiológica, por lo que se recomienda disminuir progresivamente su uso
4	SI	CM, PED, UTIA, NEF			ALBUMINA 20% frasco ampolla x 50 ml	En cirrosis: Tratamiento de PBE y S. Hepato-renal. Profilaxis en paciente con ascitis refractaria que va a ser drenado. Tratamiento por <5 días en S. Nefrótico refractario, y en hipotensión intradialisis

ANTICOAGULANTE, PROTAMINA Y ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS
(Ver capítulo 2 CARDIOVASCULAR) FARMACOS FIBRINOLITICOS
(Ver capítulo 2 CARDIOVASCULAR)
FARMACOS ANTIFIBRINOLÍTICOS Y HEMOSTÁTICOS
(Ver capítulo 2 CARDIOVASCULAR)

FÁRMACOS DE USO EN NEUTROPENIAS

8					FILGRASTIN 300 mcg ampolla	Neutropenias cíclicas con respuesta documentada, autotransplante de MO.
---	--	--	--	--	--------------------------------------	---

9. SISTEMA ENDOCRINO

HORMONAS TIROIDEAS Y FÁRMACOS ANTITIROIDEOS HORMONAS TIROIDEAS

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD PARA REALIZAR LA PRESCRIPCIÓN	HABILITADA LA PRIMER	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
8	SI	ENDOC				LEVOTIROXINA ampollas	Coma mixedematoso
2	SI	MG				LEVOTIROXINA 50/ 100 mcg comprimidos	Hipotiroidismo

FÁRMACOS ANTITIROIDEOS

4		CM, ENDOC				METILMERC APTOIMID AZOL 20 mg comprimidos	Hipertiroidismo, Enf. De Graves. Riesgo de agranulocitosis y teratogenicidad. Tratamiento inicial pacientes con requerimientos de altas dosis (máximo 60 mg/día)
4		CM, ENDOC				METILMERC APTOIMID AZOL 5 mg comprimidos	Hipertiroidismo, Enf. De Graves. Riesgo de agranulocitosis y teratogenicidad. Tratamiento de mantenimiento con dosis mínimas necesarias (2,5-5 mg/día)

GLUCOCORTICOIDES

Ver capítulo 5 ANALGÉSICOS NO OPIOIDES, GLUCOCORTICOIDES Y ANTIREUMÁTICOS

MINERALOCORTICOIDES

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
8		CM			FLUDROCORTISONA 0,1mg comp	Insuf. suprenal 1° - 2° sin respuesta a hidrocortisona oral

HORMONAS SEXUALES

ESTRÓGENOS, PROGESTÁGENOS, TESTOSTERONA

4		GIN			ESTRIOL Ovulos / Crema	Uso local
8		GIN, ENDOC	Ley 26743. Programa Nacional.		TESTOSTERONA 250mg ampollas 1m	Tratamientos hormonales relacionados a identidad de género.
8		GIN, ENDOC	Ley 26743. Programa Nacional.		UNDECANOATO DE TESTOSTERON A 100 mg inyectable	Tratamientos hormonales relacionados a identidad de género.
8		GIN, ENDOC	Ley 26743. Programa Nacional.		TESTOSTERONA 1% gel	Tratamientos hormonales relacionados a identidad de género
8		GIN, ENDOC	Ley 26743. Programa Nacional.		ESTRADIOL gel	Tratamientos hormonales relacionados a identidad de género.
8		GIN, ENDOC	Ley 26743. Programa Nacional.		ESTRADIOL comp 2 mg	Tratamientos hormonales relacionados a identidad de género.

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
8		GIN, ENDOC	Ley 26743. Programa Nacional.		ESTRADIOL comp 1 mg	Tratamientos hormonales relacionados a identidad de género.
4		GIN, ENDOC	Ley 26743. Programa Nacional.		ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625 mg comprimidos	Falla ovárica precoz. Tratamientos hormonales relacionados a identidad de género.
4		GIN	Ley 26743. Programa Nacional.		MEDROXIPROGESTERONA 10 mg comprimidos	Endometriosis. Falla ovárica precoz. Tratamientos hormonales relacionados a identidad de género.
3		GIN			NORETISTERONA 5 mg comp	Hemorragia uterina disfuncional
4		GIN			PROGESTERONA MICRONIZADA vaginal 200mcg	APP con cuello corto entre 20 y 24 semanas. Amenaza de Ab.
2		MG			LEVONORGESTREL 0.03 mcg	Anticoncepción en lactancia
2		MG			LEVONORGESTREL 0.75 mcg	Anticoncepción de emergencia dosis 1,5mcg
2		MG			LEVONORGESTREL+ ETINILESTRADIOL blister x 21 comp. o cloro prog. Ley Salud Sexual	Anticoncepción
3		MG, GIN			PROGESTERONA 100 mg ampollas	Amenorrea-Hemorragia Funcional

FÁRMACOS PARA LA INHIBICIÓN DE LA LACTANCIA

4		MG			CABERGOLINA 0,5 mg comprimidos ranurados	Agonista Dopaminérgico, Inhibición de la lactancia
---	--	----	--	--	--	--

FÁRMACOS ANTIESTROGÉNICOS

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
8		ONC			TAMOXIFENO 20 mg comprimidos	Cáncer de mama con receptores de estrógenos positivos.
8		GIN			CLOMIFENO 50 mg comp	Infertilidad Femenina Anovulatoria

FÁRMACOS ANTIANDRÓGENICOS

8		GIN, ENDOC			ESPIRONOLAC TONA comp 100mg	Tratamientos hormonales relacionados a identidad de género.
4	SI	CM			FINASTERIDE 5mg comp	HPB con próstata >40cc por ecografía y falta de Respuesta a la Terazocina

Flutamida (Ver Capítulo 18 ANTINEOPLÁSICOS)

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
----------------------	------------------------	--	----------------------------	---------------------	--------------	--

HORMONAS HIPOFISARIAS E HIPOTALÁMICAS GONADOTROFINAS

8		ENDOC			GONADOTROFINA CORIONICA 5000 UI fco amp	Estudio de hipogonadismo masculino
8		ENDOC			TRH 200 UI ampollas	Prueba de estimulación para diagnosticar hipotiroidismo secundario de origen hipofisario o hipotalámico
8		GINEC			HORMONA LIBERADORA DE GONADOTROFINA	Inducción de ovulación, en tratamiento de la infertilidad
8		ENDOC			ACTH liofilizado 25 UI frasco ampolla	Diagnóstico de Insuficiencia Suprarenal

ANÁLOGOS DE GONADORELINA

8		ENDOC, GIN			LEUPROLIDE 3,75 mg ampollas	Pubertad precoz
---	--	------------	--	--	-----------------------------	-----------------

LEUPROLIDE 7,5mg AMPOLLAS (Ver Capítulo 18 ANTINEOPLASICOS)

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
----------------------	------------------------	--	----------------------------	---------------------	--------------	--

HORMONAS DE LA NEUROHIPÓFISIS

8		CM, PED, ENDOC, UTIA			DESMOPRESINA 0,2 mg tabletas	Diabetes Insípida hipofisiaria
8 y UTIA ZAPALA		CM, PED, ENDOC, UTIA			DESMOPRESINA 4 mcg ampollas	Diabetes insípida, T. intensiva y T.intermedia estudios Pre-Ablación INCUCAI
8		PED, ENDOC, UTIA			DESMOPRESINA gotas nasales por 2,5 ml	Uso pediátrico en diabetes insípida, T. intensiva/ T.intermedia/

TRATAMIENTO PARA LA HIPERPROLACTINEMIA

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
8		NEURO, ENDOC			CABERGOLINA 2 mg comprimidos ranurados	Agonista Dopaminérgico, hiperprolactinemia, prolactinoma, 2 línea en Parkinson

10. SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

ANSIOLÍTICOS E HIPNÓTICOS BENZODIAZEPINAS

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
3		MG	VI		CLONAZEPAN 0,25% gotas x 10 ml	Convulsiones Parcial Pediátrica, espasticidad en pediatría. Ansiolítico, hipnoinductor
2		MG	VI		CLONAZEPAN 0,5 MG comprimidos	Ansiolítico, hipnoinductor
4		PSIQ, NEURO	VI		CLONAZEPAN 2 mg comprimidos	Ansiolítico, hipnoinductor, adyuvante en ciertas epilepsias
2		MG	VI Psicotrópico Lista 4(*)		DIAZEPAN 5mg comprimidos ranurados	Abstinencia,
2		MG	VI Psicotrópico Lista 4(*)	SI	DIAZEPAN 10 ampollas	Convulsiones, abstinencia, excitación psicomotriz
4		PSIQ, CM, PED			LORAZEPAN 2,5 mg comprimidos	Autorizado solo en adultos cuando es necesario el uso de benzodiazepinas en pacientes portadores de hepatopatías y/o alcoholistas severos
4		UTIA, CM, PED		SI	LORAZEPAN 4mg ampollas	Status epiléptico, uso en UTI, síndrome de abstinencia alcohólica
4		PSIQ			FLUNITRAZEPAN 1mg comp ranurados	

ANTIPSIKÓTICOS Y ANTIMANIÁICOS

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
4		PSIQ			CLOPRIMAZINA 100 mg comprimidos	Antipsicótico típico.
4		PSIQ			CLOPRIMAZINA 25 mg ampollas (0,5%)	Antipsicótico típico para uso IM
4		PSIQ			CLOPRIMAZINA 50 mg ampollas (2,5%)	Antipsicótico típico para uso EV
3		MG	SI		HALOPERIDOL 5mg amp x 1 ml.	Tratamiento del Delirium Tremens, Excitación psicomotriz
2		MG			HALOPERIDOL 10 mg compranurados	Excitación psicomotriz en pacientes con demencia. Para otros trastornos psiquiátricos debe ser indicada por psiquiatra.
2		MG			HALOPERIDOL solución oral 2mg/ml. fco x 10 ml.	Excitación psicomotriz en pacientes con demencia. Para otros trastornos psiquiátricos debe ser indicada por psiquiatra.
4		PSIQ			HALOPERIDOL DECANOATO 150mg amp x 3 ml.	Tomar precauciones para evitar errores (administración en agudo)
4		PSIQ, PED, CM			LEVOMEPRIMAZINA gotas x 30 ml	Psicosis, Excitación psicomotriz
4		PSIQ, CM			LEVOMEPRIMAZINA 25 mg comprimidos	Esquizofrenia con excitación psicomotriz. Sedativo por acción anti-histamínica central
4		PSIQ, CM			LEVOMEPRIMAZINA 25 mg ampollas	Esquizofrenia con excitación psicomotriz. Sedativo por acción anti-histamínica central

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
4		PSIQ			TIORIDAZINA	2 línea en Esquizofrenia. Evitar en pacientes con sospecha de cardiopatía o arritmias. Retirado del mercado en varios países por prolongación del QT y arritmias
5		PSIQ	VI/CI		CLOZAPINA 25 mg comprimidos	Antipsicótico Atípico. Requiere control de hemograma periódico por riesgo de neutropenia. Tratamiento inicial con 12,5 mg-25 mg/día
4		PSIQ	VI/CI		CLOZAPINA 100 mg comprimidos	Antipsicótico Atípico. Requiere control de hemograma periódico por riesgo de neutropenia. Dosis de mantenimiento 300-450 mg/día
4		PSIQ			RISPERIDONA 2 mg comprimidos	Antipsicótico Atípico. Uso en esquizofrenia, no autorizado y peligroso en ancianos con demencia, donde se observe aumento de la mortalidad.
4		PSIQ			RISPERIDONA 0,5 mg comprimidos	Antipsicótico Atípico. Uso en esquizofrenia, no autorizado y peligroso en ancianos con demencia, donde se observe aumento de la mortalidad. Ajustes inicial en caso de dosis bajas
4		PSIQ			RISPERIDONA amp DEPOSITO 37,5 mg	Antipsicótico Atípico. Uso en esquizofrenia, no autorizado y peligroso en ancianos con demencia, donde se observe aumento de la mortalidad. Efectos colaterales demostrados al haloperidol y mala adherencia que requieran depósito de la droga.
4		PSIQ			LITIO CARBONATO 300 mg comprimidos	Trastorno bipolar

FÁRMACOS ANTIDEPRESIVOS ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
4		PSIQ			CLOMIPRAMINA 75 mg comprimidos (retard)	Antidepresivo Tricíclico. Trast Obsesivo Compulsivo-Pánico y fobia-

Imipramina (Ver Capítulo 5 ANALGESICOS NO OPIOIDES)

Amitriptilina (Ver Capítulo 5 ANALGESICOS NO OPIOIDES)

INHIBIDORES DE LA RECAPTACIÓN DE SEROTONINA

2		MG			FLUOXETINA 20mg comp.	Tratamiento de la depresión primera línea. Reevaluación de la continuidad del tratamiento cada seis meses.
4		PSIQ			PAROXETINA 20mg comp.	Tratamiento de la depresión segunda línea. Reevaluación de la continuidad del tratamiento cada seis meses.

TRATAMIENTO DEL TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD

8		NEURO INF, con evaluación individual por comité de medicamentos	CI		METILFENIDATO 10 mg comprimidos	Deficit de Atención - Evaluación por equipo multidisciplinario. Evaluación de cada caso por comité de medicamentos.
---	--	--	----	--	------------------------------------	---

TRATAMIENTO DEL TABAQUISMO ANTIDEPRESIVOS

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
2		MG con capacitación reconocida en TBQ	Recetario especial		BUPROPION 150 mg comprimidos	Dosis recomendada 150 mg/día en la mañana. Evitar uso en embarazadas, adolescentes y epilépticos. No autorizado fuera de un seguimiento y tratamiento cognitivo conductual

TERAPIA DE REEMPLAZO NICOTÍNICO

2		MG con capacitación reconocida en TBQ	Recetario especial		CARAMELOS DE NICOTINA 2mg	Usar a libre demanda a partir del día D. Explicar al paciente técnica de utilización.
2		MG con capacitación reconocida en TBQ	Recetario especial		PARCHE DE NICOTINA 57,4mg	Un parche diario.

ANTIEPILÉPTICOS Y ANTICONVULSIVANTES

4		NEURO, PED			ACIDO VALPROICO jarabe x120 ml	Epilepsias de inicio generalizadas o de difícil clasificación en Pediatría
4		NEURO, PED, CM			ACIDO VALPROICO comprimidos x200mg	Epilepsias de inicio generalizadas o de difícil clasificación Trastorno bipolar
4		NEURO, PED, CM			ACIDO VALPROICO comprimidos x400mg	Epilepsias de inicio generalizadas o de difícil clasificación Trastorno bipolar

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
4		NEURO, PED, CM			DIVALPROATO DE SODIO 250mg	Epilepsias de inicio generalizadas o de difícil clasificación, Ausencias. Trastorno bipolar
4		NEURO, PED, CM			DIVALPROATO DE SODIO 250mg	Epilepsias de inicio generalizadas o de difícil clasificación, Ausencias. Trastorno bipolar
4	SI	NEURO, PED, CM			ACIDO VALPROICO 100 /ml ampollas	Pacientes en tratamiento con acido valproico con contraindicaciones de tratamiento oral.
4		CM			CARBAMAZEPINA 200 mg comprimidos	Dolor neuropático, epilepsia. No utilizar en alcoholismo por falta de efectividad y riesgo de efectos adversos hepáticos y cutáneos graves
4		PED			CARBAMAZEPINA Jarabe x60 ml	Epilepsia y dolor neuropático en Pediatría
4		CM			FENITOINA 100 mg comprimidos	Epilepsia en Adulto
4		CM			FENITOINA 25mg/ml. suspensión x 100ml.	Epilepsia
3		MG			SI	FENITOINA SODICA 50 mg/ml. amp. x 2ml

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
4		PED			FENOBARBITAL 0,015g comp.	Epilepsia en pediatría
4		PED, CM			FENOBARBITAL 0,1g comp. ranurados	Epilepsias
4		CM		SI	FENOBARBITAL 200mg amp	Convulsiones, status epileptico
8		NEURO			ETOSUXIMIDA 250 mg comprimidos	Epilepsias de inicio generalizadas. Ausencias - 2ª línea Droga de segunda línea en epilepsias generalizadas o no clasificadas, sin respuesta al Acido Valproico. Presenta menor efectividad que éste. Alternativa en primera línea para tratar mujeres embarazadas o en edad fértil debido a menor riesgo teratogénico que otros antiepilépticos de primera línea. No autorizado como primera línea monoterapia en hombres. Advertir que ante el inicio de rash debe suspenderse y consultar en forma urgente debido a casos de Stevens-Johnson
8		NEURO	VI		LAMOTRIGINA 100 mg comprimidos	Droga de segunda línea en epilepsias generalizadas o no clasificadas, sin respuesta al Acido Valproico. Presenta menor efectividad que éste. Alternativa en primera línea para tratar mujeres embarazadas o en edad fértil debido a menor riesgo teratogénico que otros antiepilépticos de primera línea. No autorizado como primera línea monoterapia en hombres. Advertir que ante el inicio de rash debe suspenderse y consultar en forma urgente debido a casos de Stevens-Johnson
8		NEURO	VI		LAMOTRIGINA 50 mg comprimidos	Droga de segunda línea en epilepsias generalizadas o no clasificadas, sin respuesta al Acido Valproico. Presenta menor efectividad que éste. Alternativa en primera línea para tratar mujeres embarazadas o en edad fértil debido a menor riesgo teratogénico que otros antiepilépticos de primera línea. No autorizado como primera línea monoterapia en hombres. Advertir que ante el inicio de rash debe suspenderse y consultar en forma urgente debido a casos de Stevens-Johnson

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
8		NEURO	VI		LAMOTRIGINA 25mg comprimidos	<p>Droga de segunda línea en epilepsias generalizadas o no clasificadas, sin respuesta</p> <p>al Acido Valproico. Presenta menor efectividad que éste. Alternativa en primera línea para tratar mujeres embarazadas o en edad fértil debido a menor riesgo teratogénico que otros antiepilépticos de primera línea. No autorizado como primera línea monoterapia en hombres. Advertir que ante el inicio de rash debe suspenderse y consultar en forma urgente debido a casos de Stevens-Johnson</p>
8		NEURO	VI		VIGABATRIM 500 mg comprimidos	Epilepsia 2 línea . Farmacovigilancia. Intensificada por reportes de disminución visual irreversible.
8		NEURO			TOPIRAMATO 100 mg comp.	Segunda línea en profilaxis de migraña. Tercera línea en epilepsias simples, complejas y tónico-clónicas secundariamente generalizadas
8		NEURO			TOPIRAMATO 25 mg comp.	Segunda línea en profilaxis de migraña. Tercera línea en epilepsias simples, complejas y tónico-clónicas secundariamente generalizadas
8		NEURO			TOPIRAMATO 50 mg comp.	Segunda línea en profilaxis de migraña. Tercera línea en epilepsias simples, complejas y tónico-clónicas secundariamente generalizadas
8		NEURO INF			CLOBAZAM 10 mg comprimidos	Epilepsia Refractaria Pediátrica-Solo con documentación del fracaso de otras drogas de primera línea en dosis máxima

FÁRMACOS PARA EL TRATAMIENTO DEL MAL EPILÉPTICO

LORAZEPAM (Ver Ansiolíticos e Hipnóticos), DIAZEPAM (Ver Ansiolíticos e Hipnóticos), FENITOINA (Ver Antiepilépticos) FENOBARBITAL (Ver Antiepilépticos), TIOPIENTAL SODICO (Ver Capítulo Anestésicos)

ANTIPARKINSONIANOS FÁRMACOS DOPAMINÉRGICOS

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
4		CM, NEURO			LEVODOPA + CARBIDOPA 250/25 mg comprimidos	Enf. De Parkinson. Comenzar con 125/12,5 mg c/8 hrs una hora antes de las comidas. Incrementar la dosis gradualmente. Efectos adversos digestivos, hipotensión ortostática y fenómenos motores (discinecias, fluctuaciones)
8		NEURO			BROMOCRIPTINA 5 mg comp birranurados	2da. línea Parkinson. Agonista dopaminérgico D2. Dosis 5-50 mg/día -No autorizado para inhibición de la lactancia

FÁRMACOS ANTIMUSCARÍNICOS

4		PSIQ, NEURO			BIPERIDENO 2 mg comprimidos	2da. Línea Enfermedad de Parkinson. Rigidez por antipsicóticos. Efectos adversos sobre función cognitiva, síndrome confusional y retención urinaria.
4		PSIQ, NEURO, CM			BIPERIDENO 5mg ampollas	Rigidez por antipsicóticos. Sobredosis, intoxicaciones

ANTIVERTIGINOSOS Y ANTICINÉTICOS

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
2		MG			CLORFENIRAMINA 2 mg/ 5 ml x 100 ml	Reacción Alérgica Tratamiento Corto
2		MG			CLORFENIRAMINA 4 mg comprimidos	Vertigo periférico. Reacción Alérgica Tratamiento Corto
2		MG		SI	Difenhidramina 100mg frasco ampollas	Vertigo periférico. Reacción Alérgica aguda

FÁRMACOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

8		NEURO			INTERFERON BETA 1a 6.000.000 UI frasco ampolla	Esclerosis múltiple
8		NEURO			INTERFERON BETA 1b 8.000.000 UI frasco ampolla	Esclerosis múltiple

FÁRMACOS USADOS EN LA HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA

Nimodipina (Ver Capítulo 2 Cardiovascular. Antihipertensivos)

FÁRMACOS USADOS EN EL TEMBLOR ESENCIAL

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
----------------------	------------------------	--	----------------------------	---------------------	--------------	--

Propranolol (Ver capítulo 2 Cardiovascular. Fármacos bloqueantes adrenérgicos)

8		NEURO			PRIMIDONA 250 mg comprimidos	Segunda línea en Tembloresencial
---	--	-------	--	--	---------------------------------	----------------------------------

FÁRMACOS USADOS EN LAS DISTONIAS, ESPASMOS Y ESPASTICIDAD

8 y HB R		NEURO, TRA PED y FISIATRA HBR	VI		TOXINA BOTULINICA ONABOTULINUM Tipo A 100 UI ampollas	Espasticidad, distonías, espasmo hemifacial
8 y HB R		NEURO, TRA PED y FISIATRA HBR			BACLOFENO 10 mg comprimidos	Espasticidad severa secular

FÁRMACOS SEDANTES HIPNÓTICOS PARA REALIZAR ESTUDIOS EN NIÑOS

8		NEURO PED			HIDRATO DE CLORAL	Estudios neurológicos en niños menores de 5 años (EEG). Ef. Adversos: vómitos, ataxia, mareos, pesadillas. Menos frecuente ictericia, reacciones idiosincráticas como comportamiento paranoide. Si no está adecuadamente diluido: irritante de piel y mucosas. Corto período de estabilidad.
---	--	-----------	--	--	-------------------	---

II. ANTIHISTAMÍNICOS

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
2		MG			CLORFENIRAMINA 2 mg/ 5 ml x 100 ml	Reacción Alergica Tratamiento Corto
2		MG			CLORFENIRAMINA 4 mg comprimidos	Vertigo periférico. Reacción Alergica Tratamiento Corto
3		MG/LO		SI	DIFENHIDRAMINA 100mg frasco ampollas	Vertigo periférico. Reacción Alergica Aguda
2		MG			LORATADINA 10 mg comprimidos	Reacciones alérgicas. Rinitis alérgica en tratamientos de hasta cinco días
2		MG			LORATADINA jarabe	Reacciones alérgicas. Rinitis alérgica en tratamientos de hasta cinco días
6		DER, QX plástica, equipo de quemados			HIDROXICINA jarabe	Prurito refractario en Quemados/Dermatología
6		DER, QX plástica, equipo de quemados			HIDROXICINA 25 mg comprimidos	Prurito refractario en Quemados/Dermatología

12. APARATO GENITOURINARIO

FÁRMACOS ESTIMULANTES DE LA CONTRACTILIDAD UTERINA

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
3	SI	MG, GINECO			Misoprostol comprimidos vaginales 25mcg	Inducción del trabajo de parto. Solo uso en la internación
2	SI	MG, GINECO			Misoprostol comprimidos vaginales 200mcg	ILE. Hemorragia post parto
3	SI	MG/LO			OCITOCINA SINTETICA 5 UI amp	Inducción del trabajo de parto. Recomendación de limitar progresivamente su uso reemplazándola por Misoprostol vaginal

RELAJANTES UTERINOS

3	SI	MG		SI	NIFEDIPINA 10 mg comp.	Amenaza de parto prematuro, Hipertensión del embarazo, Hipertensión pulmonar, Contraindicado su uso sublingual
3	SI	MG, GINECO			RITODRINA 50 mg ampollas	Tocolítico de segunda línea. Paulatinamente reemplazado por Nifedipina comprimidos de 10 mg
4		OBS			INDOMETACINA supositorios	Amenaza de parto prematuro en embarazo menor de 32 semanas

FÁRMACOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ECLAMPSIA

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
3	SI	MG		SI	SULFATO de MAGNESIO 25 ó 50% ampollas x 10ml	Eclampsia, Antiarrítmico, reposición en hipomagnesemias

FÁRMACOS PARA LA RETRACCIÓN UTERINA

3		MG, GINI/LO		SI	Ergonovina 0,2 mg ampollas	Retracción uterina
3		MG, GINI/LO			Ergonovina 0,2 mg comprimidos	Hemorragias post-parto

FÁRMACOS PARA LA RETENCIÓN URINARIA (PROSTATISMO Y ADENOMA BENIGNO DE PRÓSTATA) BLOQUEANTES ALFA I

2	SI	MG			TERAZOSINA 5 mg comprimidos	Hipertrofia prostática benigna.
---	----	----	--	--	--------------------------------	---------------------------------

FÁRMACOS PARA EL ADENOMA BENIGNO DE PRÓSTATA

4	SI	CM, URO			FINASTERIDE 5 mg comprimidos	HPB con próstata >40 cc por ecografía y falta de respuesta a la Terazocina
---	----	------------	--	--	---------------------------------	--

FÁRMACOS EN INCONTINENCIA URINARIA

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
4		PED, MG			OXIBUTININA 1 mg/ml. jbe x200ml.	Enuresis, vejiga neurogénica
4		PED, MG			OXIBUTININA BROMURO 5mg comp	Enuresis, vejiga neurogénica, incontinencia urinaria

FÁRMACOS ANALGÉSICOS UROLÓGICOS

4		END			LIDOCAINA VISCOSA envase 50ml	Procedimientos endouretrales, durante proctoscopia y rectoscopia
---	--	-----	--	--	----------------------------------	---

13. FÁRMACOS DE USO OFTALMOLÓGICO, OTORRINOLARINGOLÓGICO Y ODONTOLÓGICO

FÁRMACOS DE ACCIÓN OFTALMOLÓGICA MIDRIÁTICOS Y CICLOPLÉJICOS ANTIMUSCARÍNICOS

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
4		OFT			ATROPINA Sulfato 1% colirio x10 ml	Midriático anticolinérgico para procedimientos oftalmológicos. No utilizar en glaucoma de ángulo cerrado
4		OFT			CICLOPENTOLATO 1% colirio	Midriático anticolinérgico para procedimientos oftalmológicos. No utilizar en glaucoma de ángulo cerrado

MIXTOS

2		MG			TROPICAMIDA 0,5% + FENILEFRINA 5% colirio x10ml	Midriático antimuscarínico combinado con simpático-mimético. Fondo de Ojo. En pacientes con cámara anterior estrecha derivar para evaluación por Oftalmólogo
---	--	----	--	--	---	---

FÁRMACOS PARA EL TRATAMIENTO DEL GLAUCOMA MIÓTICOS

2		MG		SI	Pilocarpina 2,5% colirio	Tratamiento inicial del glaucoma de ángulo abierto. Util en glaucoma de ángulo estrecho.
---	--	----	--	----	--------------------------	--

BLOQUEANTES BETA

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
4		OFT			TIMOLOL MALEATO 0,5% colirio	Glaucoma

INHIBIDORES ANHIDRASA CARBÓNICA

4		OFT			ACETAZOLAMIDA 250 mg comprimidos	Glaucoma
4		OFT			Dorzolamida 2% gotas oftálmicas x 5ml	Segunda línea en tto del Glaucoma, en pacientes refractarios que ya reciben pilocarpina y timolol, o presentan intolerancia
4		OFT			Latanoprost 0,005%	Glaucoma refractario al uso combinado de pilocarpina, timolol y dorzolamida

FÁRMACOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA CONJUNTIVITIS ALÉRGICA

4		OFT			Cromoglicato desodio 4% colirio x 10ml g	Conjuntivitis y queratoconjuntivitis alérgica
---	--	-----	--	--	---	---

FÁRMACOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA CONJUNTIVITIS BACTERIANA

2		MG			GENTAMICINA X10 ml. colirio	Conjuntivitis
---	--	----	--	--	--------------------------------	---------------

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
3		MG			Eritromicina 0,5g pomada oftálmica cápsulas	tratamiento de conjuntivitis Bacteriana, Profilaxis de la Conjuntivitis en neonatos, Ulcera de Cornea
4		OFT			OFLOXACINA 0,3% colirio x 5 ml.	Segunda línea de tratamiento en conjuntivitis bacteriana refractaria a gentamicina.

LUBRICANTES OCULARES

2		MG			LAGRIMAS ARTIFICIALES alcohol polivinílico colirio x 10 ml	Ojo Seco. Sdme de Sjogren. Parálisis facial periférica
4		OFT			LAGRIMAS ARTIFICIALES hidroxipropilmetilcelulosa colirio x 15 ml	Casos severos de Ojo Seco, Sdme de Sjogren, Parálisis facial periférica
4		OFT, CM, PED			HIDROXIPROPILMETILCELULOSA ungüento oftálmico	Ojo Seco. Sdme de Sjogren. Parálisis facial periférica
4		OFT			Acido Poliacrílico 0,2% gel	Ojo Seco. Sdme de Sjogren. Parálisis facial periférica. Queratiits, úlceras de cornea

FÁRMACOS PARA DIAGNÓSTICO

2		MG			FLUORESCINA 0,25% colirio x 50 ml.	Emerg trauma ocular. Úlcera de cornea
8		OFT			FLUORESCINA amp 5ml	Retinografía

ANESTÉSICOS LOCALES

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
2		MG			TPROPACAINA 0,5% colirio	Anestesia para procedimientos oftalmológicos, extracción de cuerpo extraño. Contraindicado como tratamiento de la úlcera corneal.
4		OFTALMO			Lidocaína 4% colirio	Anestesia para procedimientos oftalmológicos, extracción de cuerpo extraño. Uso previo a las cirugías.

Lidocaína inyectable ver capítulo de Anestésicos

ANTIINFLAMATORIOS

4		OFT			Dexametasona 0,1% colirio 10ml	En postoperatorio y en infecciones severas
---	--	-----	--	--	--------------------------------	--

Analgésicos vía oral y ATB vía oral por Capítulos respectivos

FÁRMACOS DE ACCIÓN RINOOROFARÍNGEA

ANTIALÉRGICOS TÓPICOS

BUDESONIDE 100 mcg (solo por ORL)

DESCONGESTIVOS LOCALES Y HUMECTANTES

CLORURO DE SODIO 0,9%

FÁRMACOS ANTIINFECCIOSOS

(VER CAP. 3 ANTIBIÓTICOS)

FÁRMACOS ANTIFÚNGICOS (MUCOSAS)

(VER CAP. 3 ANTIBIÓTICOS)

FÁRMACOS ANALGÉSICOS

LIDOCAINA SPRAY

FÁRMACOS DE ACCIÓN ODONTOLÓGICA

2		ODO			CARTICAINA 4% CE anestubos 1,8ml.	Uso Odontológico
2		ODO			LIDOCAINA 2% CE anestubos	

FÁRMACOS ANTIANGIOGÉNICOS

8		OFT		BEVACIZUMAB 25 mg/ml	<i>Degeneración macular asociada a la edad, maculopatía diabética</i>
---	--	-----	--	----------------------	---

14. INMUNOLOGÍA Y VACUNAS

INMUNOGLOBULINAS ESPECÍFICAS

GAMMAGLOBULINA HIPERINMUNE ANTI VIRUS HEP B 200 mg/ml.

GAMMAGLOBULINA HIPERINMUNE VARICELA

GAMMAGLOBULINA HIPERINMUNE ANTIRÁBICA mg/ml.

GAMMAGLOBULINA HIPERINMUNE ANTIRHO 300 mg/ml.

GAMMAGLOBULINA HIPERINMUNE ANTITETÁNICA+TOXOIDE

GAMMAGLOBULINA INESPECIFICA E.V. X 10g

GAMMAGLOBULINA INESPECIFICA E.V. X 5 g

VACUNAS

VACUNA ANTIGRIPAL cepa OMS del año

VACUNA ANTI-HAEMOPHILUS INFLUENZA B MONODOSIS

VACUNA ANTIMENINGOCÓCCICA A+C

VACUNA ANTINEUMOCÓCCICA MONODOSIS (prellenada)

VACUNA ANTINEUMOCÓCCICA 23 Cepas

VACUNA ANTIPOLIOMIELÍTICA SALK

VACUNA ANTIPOLIOMIELÍTICA SALK MONODOSIS (prellenada)

VACUNA ANTIRRÁBICA

VACUNA ANTIVARICELOSA virus inactivado

VACUNA B.C.G. x 10 ó 20 dosis

VACUNA CUÁDRUPLE ACELULAR

VACUNA CUÁDRUPLE MONODOSIS

VACUNA DOBLE ADULTO

VACUNA DOBLE VIRAL

VACUNA HEPATITIS A MONODOSIS

VACUNA HEPATITIS B MONODOSIS 10 ó 20 mcg

VACUNA PPD

VACUNA SABIN

VACUNA TRIPLE BACTERIANA

VACUNA TRIPLE VIRAL MONODOSIS

VACUNA PARA LA FIEBRE AMARILLA

VACUNA PARA EL VPH

VACUNA PARA EL ROTAVIRUS

Sueros específicos para aracnoidismo y ofidios ver capítulo 20 Toxicología

15. ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMERA PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
2		MG/LO		NO	<p>IODOPOVIDONA 10% SOLUCIÓN</p>	<p>Solución antibacteriana de uso tópico externo</p>
2		MG/LO		NO	<p>IODOPOVIDONA 5% SOLUCIÓN JABONOSA</p> <p>Agua oxigenada 10%</p> <p>Formol 40%</p>	<p>Lavado de manos en GUARDIA, SALA, UTI, NEO, QUIRÓFANO; y baño prequirúrgico</p>
2		MG/LO		NO	<p>CLORHEXIDINA 4% SOLUCIÓN JABONOSA</p>	<p>Lavado de manos en UTI, NEO, QUIRÓFANO, ÁREA DE QUEMADOS, baño prequirúrgico de paciente.</p>
2		MG/LO		NO	<p>ALCOHOL EN GEL AL 70%</p>	<p>ANTISEPSIA DE MANOS</p>

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD PARA REALIZAR LA PRIMERA PRESCRIPCIÓN	HABILITADA LA PRIMERA PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
2		MG/LO			NO	Alcohol etílico 96%	
						Alcohol etílico 70%	
En quirófano o endoscopia		MG/LO			NO	NITROFURA ZONA 0,2 %	
2		MG/LO			NO	ORTOFTALDEHÍDO 0,55%	Desinfección de alto nivel
						Detergente enzimático de tres enzimas: proteasa, lipasa y amilasa	Lavado de material
2		UTIA, UTIP, UTIN			NO	Espuma detergente compuesto por clorhidrato de polihexametileno 0,096% y cloruro de didecilmetilamonio 0,14%	Desinfectante para limpieza de equipos y productos sanitarios (ejemplo: bombas, cunas, etc.)

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMERA PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
8		NEO		NO	<p>Spray incoloro de clorhexidina de digluconato</p> <p>Resina de colofonia, esencia de trementina</p>	<p>Desinfección en la colocación de vías centrales</p> <p>Fijación de gasas y vendajes</p>

16. ANESTÉSICOS

ANESTÉSICOS LOCALES

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
2		LO			LIDOCAINA 1% SE frasco ampolla x 20 ml	Anestésico local
2		ODO, END, AN			LIDOCAINA 10% SPRAY x 82 gramos	ORL, Odontol, Anestesia, endoscopias bucofaringea en Endoscopías y Odontología
2		MG			LIDOCAINA 2% SE frasco ampolla x 20ml	Anti arritmico de segunda línea. Uso en arritmias ventriculares. Anestésico local
2		ODO			LIDOCAINA 2% con Epinefrina frasco ampolla x 20ml	Anestésico local
2		MG			LIDOCAINA JALEA envase 25 gramos	Anestesia de superficie y lubricante para exploración por sonda, en procedimientos endoscópicos en cavidades nasal y faríngea, tales como gastroscopía, intubación traqueal.
4		END			LIDOCAINA VISCOSA envase 50ml	Procedimientos endouretales, durante proctoscopia y rectoscopia
4		MG		SI	Procaína 50% ampollas	Anestésico local

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
4		AN			BUPIVACAINA 0,5% SE frasco ampolla	Uso en Anestesia
4		AN			BUPIVACAINA 0,75% SE frasco ampolla	Uso en Anestesia
4		AN			BUPIVACAINA ESPINAL HIPERBARICA 0,5% ampollas	Uso en Anestesia

Lidocaína 2% CE anestubos para odontología (Ver capítulo 13 OFTALMOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA Y ODONTOLOGIA)

Proparacaína colirio (Ver Capítulo 13 OFTALMOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA Y ODONTOLOGIA)

ANESTÉSICOS GENERALES ANESTÉSICOS POR VÍA INTRAVENOSA

3		MG		SI	TIOPIENTAL 1 g frasco ampolla lío filizado	Intubación orotraqueal. Dosis 1,5-3 mg/Kg
3		MG			KETAMINA 50 mg frasco ampolla	Sedo-analgésia para procedimientos quirúrgicos cortos
4		AN, CAR	VI		PROPOFOL 10 mg/ml x20 ml	Procedimientos anestésicos, cardioversión eléctrica programada. Contra Entrega de Envase-Foja Anestésica

ANESTÉSICOS INHALATORIOS

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
4		AN			ISOFLURANO frasco x 125 ml	Elaborar la (DC)
4		AN			SEVOFLURANO frasco x 250 ml	Anestesico general inhalatorio

FÁRMACOS COMPLEMENTARIOS

4		AN			FENTANILO + DROPERIDOL amp.	Neurolepto-analgesia
3		MG		SI	FENTANILO 0,05 mg/ml. amp. x 5 ml.	Analgésico opiáceo. En intubación orotraqueal. dosis 1-3 microgr/Kg. Para analgesia reglada solo en UTI
4	SI	AN			REMIFENTANILO 5 mg fco/ampolla 1 mg/ml	Adyuvante anestésico para anestesia general
3		CM, PED		SI	Midazolam 15mg ampollas x3 ml	Secuencias de intubación orotraqueal dosis 0,2 mg/Kg. Uso no autorizado en Neonatología
4		AN			Efedrina 50mg ampollas	Uso por anestesia en hipotensión durante cesárea por bloqueo
8		NEURO, NEO			Hidrato de cloral	Estudio de EEG y procedimientos en niños. Preparado de corto período de estabilidad

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
4		AN			CAFEÍNA ampollas	Cefalea post-punción lumbar. No utilizar en Neonatología por excipiente alcohol benzoico

FÁRMACOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA HIPERTERMIA MALIGNA

6		AN			DANTROLENE ampollas	Tratamiento de la hipertermia maligna. Tratamientos completos en HPN y H. Zapala
---	--	----	--	--	---------------------	--

Neostigmina (Ver Capítulo 17 BLOQUEANTES MUSCULARES. Anticolinesterásicos)

17. BLOQUEANTES NEUROMUSCULARES

BLOQUEANTES NEUROMUSCULARES

BLOQUEANTES NEUROMUSCULARES NO DESPOLARIZANTES

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
3		MG		SI	PANCURONIO BROMURO 4mg amp	Relajante muscular de inicio de acción prolongada (3,5 a 5 min), y de duración de acción prolongada (45-60 min). Dosis carga 0,06-0,08 mg/Kg. Dosis mantenimiento 0,02-0,03 mg/Kg c/1-2 hrs
4		AN			ATRACURIO 50 mg frasco ampolla	Uso en casos de Insuficiencia renal o Hepática . Ptes selec. según criterio del anestesista
4		AN	VI		VECURONIO 4 mg ampollas	Uso restringido contra entrega de envase y foja anestésica.

BLOQUEANTES NEUROMUSCULARES DESPOLARIZANTES

3	SI	MG		SI	SUCCINILCOLINA 500 mg frasco ampolla	Relajante muscular de rápido inicio de acción (1-1,5 min), y duración ultracorta (5-10 min). Uso en secuencia de intubación orotraqueal
---	----	----	--	----	--------------------------------------	---

ANTICOLINESTERÁSICOS Y FÁRMACOS PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA MIASTENIA GRAVIS

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
4		AN		SI	NEOSTIGMINA 0,5 mg/ml ampollas	Uso en anestesia para revertir el bloqueo neuromuscular por agentes no despolarizantes. Dosis 0,05 mg/Kg
8		NEURO			PIRIDOSTIGMINA 60 mg cápsulas	Inhibidor de la acetilcolinesterasa. Uso crónico en Miastenia Gravis

18. ANTINEOPLÁSICOS E INMUNOSUPRESORES

FÁRMACOS CITOTÓXICOS FÁRMACOS ALQUILANTES

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
8		ONC			CISPLATINO 50mg frasco ampolla	
8		ONC, HEM			IFOSFAMIDA 1g frasco ampolla	
8		HEM, ONC, NEF			CICLOFOSFAMIDA 1g frasco ampolla	Uso oncológico y en enfermedades autoinmunitarias
4		HEM, ONC, NEF			CICLOFOSFAMIDA 50mg comprimidos	
8		ONC			CLORAMBUCILO 2 mg comprimidos	
8		ONC, HEM			MELFALANO 5mg comprimidos	
		ONC, HEM			DACARBAZINA 100mg y 200 mg ampolla	

ANTIBIÓTICOS ANTINEOPLÁSICOS

NIVEL DE COMPLIENCIA	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
8		ONC, HEM			Doxorrubicina liposomal 50mg frasco ampolla	
8		ONC, HEM			Doxorrubicina 50mg frasco ampolla	Antraciclina
8		ONC, HEM			IDARRUBICINA 10mg frasco ampolla	Antraciclina
8		ONC			Mitoxantrona 20mg frasco ampolla	Antraciclina
8		ONC			Mitomicina 20 mg frasco ampolla	
8		ONC, HEM			Daunoblastina 20 mg ampollas	
8		ONC			Epirubicina 50 mg frasco ampolla	Antraciclina
8		ONC, HEM			Bleomicina frasco ampolla 15 mg/10ml	
8		ONC			Dactinomicina 0,5% frasco ampollas	

NIVEL DE COMPL E- IIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
8		ONC, HEM			Metotrexato 50mg frasco ampolla	
8		ONC, HEM			Metotrexato 500mg frasco ampolla	
8		ONC, HEM			CITARABINA 100mg frasco ampolla	
8		ONC, HEM			CITARABINA 1g frasco ampolla	
8		ONC, HEM			FLUDARABINA 50mg frasco ampolla	
8		ONC			FLUOROURACILO 500mg ampolla	
8		ONC, HEM			MERCAPTOPURINA 50 mg. Comprimidos	Uso Oncológico y en Enfermedad Inflamatoria Intestinal refractaria
8		ONC, HEM			ASPARAGINASA 10.000 UI frasco ampolla	No se clasifica como antimetabolitos, otros o misceláneo
		ONC			CAPECITABINA 500 mg comprimidos	
		ONC			GEMCITABINA 1 g ampolla	
		HEM			CLADRIBINE 20 mg ampolla	

ALCALOIDES DE LA VINCA Y ETOPÓSIDO

8		ONC			VINBLASTINA 10mg ampollas	
---	--	-----	--	--	------------------------------	--

NIVEL DE COMPL E- IJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
8		ONC			VINCRIPTINA 1 mg frasco ampolla	
8		ONC			VINORELBINA 50 mg frasco ampolla	
8		ONC			ETOPOSIDO 100 mg ampollas	Derivado de podofitotoxina

COMPUESTOS DE PLATINO

8		ONC, HEM			CARBOPLATINO 150 mg frasco ampolla	
8		ONC			CISPLATINO 50 mg frasco ampolla	
8		ONC			OXILIPLATINO 50 y 100 mg frasco ampolla	alquilante

PROCARBAZINA Y OTROS AGENTES ANTINEOPLÁSICOS

8		ONC			PROCARBAZINA 50 mg comprimidos	
8		ONC, HEM			Dacarbacina	
8		ONC, HEM			HIDROXIUREA 500 mg comprimidos	Se clasifica como antimetabolito

TAXANOS

NIVEL DE COMPL E- IJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
8		ONC			PACLITAXEL 300mg fco ampolla	
8		ONC			Docetaxel 20mg frasco ampolla	
8		ONC			Docetaxel 80mg frasco ampolla	

INHIBIDORES DE LA TOPOISOMERASA

8		ONC			Idarubicina 10 mg ampolla	
8		ONC			TOPOTECAN 4 mg frasco ampolla	
8		ONC			IRINOTECAN 100 mg frasco ampolla.	

ANTAGONISTAS HORMONALES Y DE ACCIÓN HORMONAL

Tamoxifeno (Ver capítulo 9 ENDOCRINO)

		ONC			MEDROXIPROGESTERONA 500 mg comprimidos	Uso Oncológico, Neoplasias hormonadependientes
8		ONC			FLUTAMIDA 250mg comprimidos	
8		ENDOC			LEUPROLIDE 7,5 mg ampollas	
8		ONC			ACETATO DECIPROTERONA 50 mg	Cáncer de Próstata

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
8		ONC			Anastrozol 1 mg comprimido	
8		ONC			Bicalutamida 50 mg comprimido	
8		ONC			Letrozol 2,5 mg comprimido	
8		NEUROQX, ENDOC			OCTREOTRIDO 20 y 30 mg de liberación controlada	Tumores de hipófisis

FÁRMACOS QUE AFECTAN LA RESPUESTA INMUNE INMUNOSUPRESORES ANTIPROLIFERATIVOS

8		ONC			INTERFERON ALFA 2b 10.000.000 UI frasco ampolla
8		ONC			INTERFERON ALFA 2b 3.000.000 UI frasco ampolla
8		ONC			INTERFERON ALFA 2b 5.000.000 UI frasco ampolla

OTROS FÁRMACOS

Azatioprina (Ver Capítulo 5 ANALGÉSICOS NO OPIOIDES, GLUCOCORTICOIDES Y ANTIREUMÁTICOS) Micofenolato (Ver Capítulo 5 ANALGÉSICOS NO OPIOIDES, GLUCOCORTICOIDES Y ANTIREUMÁTICOS) Prednisolona (Ver Capítulo 5 ANALGÉSICOS NO OPIOIDES, GLUCOCORTICOIDES Y ANTIREUMÁTICOS) Ciclosporina (Ver Capítulo 5 ANALGÉSICOS NO OPIOIDES, GLUCOCORTICOIDES Y ANTIREUMÁTICOS) Tacrolimus (Ver Capítulo 5 ANALGÉSICOS NO OPIOIDES, GLUCOCORTICOIDES Y ANTIREUMÁTICOS)

8		ONC, HEM			FLUDARABINA 50mg frasco ampolla	antimetabolito
8		ONC, HEM			IMATINIB 100 y 300 mg comprimidos recubiertos	Inhibidor de protein quinasa Leucemia Mieloide Crónica
8		ONC, HEM			Bortezomib 3,5 mg ampolla	Inhibidor del proteosoma, tratamiento del mieloma múltiple-
8		ONC, HEM			Pamidronato 90 mg ampolla	Tratamiento de metástasis óseas
8		ONC, HEM			Anagrelide 0,5 mg comprimido	

NIVEL DE COMPL E- JIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
8		ONC, HEM			Erwinia asparaginasa ampolla 10000 UI	
8		ONC, HEM			IMATINIB 100 y 300 mg comprimidos recubiertos	Inhibidor de protein quinasa Leucemia Mieloide Crónica
8		ONC, HEM			Bortezomib 3,5 mg ampolla	Inhibidor del proteosoma, tratamiento del mieloma múltiple-
8		ONC, HEM			Pamidronato 90 mg ampolla	Tratamiento de metástasis óseas
8		ONC, HEM			Anagrelide 0,5 mg comprimido	

NIVEL DE COMPL E- JIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
8		ONC, HEM			IMATINIB 400mg comprimidos recubiertos	Inhibidor de protein quinasa Leucemia Mieloide Crónica
8		ONC, HEM	Con dictamen por caso		SUNITINIB 25 mg y 50 mg	Inhibidor de protein quinasa
8		HEM	CI		ACIDO TRANSRETINOICO 10 mg cápsulas	Leucemia Promielocítica
8		HEM			RITUXIMAB 100/500mg frasco ampollas	Anticuerpo monoclonal Linfoma Folicular NO HODKIN III-IV CD20+

OTROS ANTICUERPOS MONOCLONALES

8		ONC	Dictamen / VI		TRASTUZUMAB	CANCER DE MAMA HER2NEU+
---	--	-----	---------------	--	-------------	-------------------------

DEXAMETASONA COMPRIMIDOS Y AMPOLLAS (Ver CAPITULO 5 ANALGESICOS NO OPIOIDES, GLUCOCORTICOIDES Y ANTIREUMATICOS)

FÁRMACOS COMPLEMENTARIOS

8		ONC, HEM			LEUCOVORINA (Acido folínico) 15 mg comprimido	Plan Nacional VIH/Sida y Oncología
8		ONC, HEM			LEUCOVORINA (Acido folínico) 50 mg ampollas	
8		ONC, HEM	CI / VI / Dispo ANMAT 7720 2006		TALIDOMIDA 50 y 100 mg	Mieloma múltiple, mielofibrosis y mielodisplasia

NIVEL DE COMPL E- IIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
8		ONC, HEM			MESNA 200 mg ampollas	Análogo de mostaza nitrogenada. Antimetabolito usado para prevención de cistitis hemorrágica secundaria a Ifosfamida-ciclofosfamida

FILGASTRIM (Ver capítulo 8 SANGRE)

BCG -Calmette-Guerin- (Ver capítulo 14 INMUNOGLOBULINAS Y VACUNAS)

TALIDOMIDA (Ver capítulo 3 ANTIINFECCIOSOS)

INHIBIDOR DE PROTEINQUINASA

8		ONC, HEM			Dasatinib comprimido 70 mg y 100 mg	
---	--	----------	--	--	--	--

19. CONTRASTES RADIOLÓGICOS

BLOQUEANTES NEUROMUSCULARES

BLOQUEANTES NEUROMUSCULARES NO DESPOLARIZANTES

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMERA PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
8		RAD			M. DE CONTRASTE ARTERIOGRAFIA	Frasco-ampollas de medio de contraste para ARTERIOGRAFIA a dosis útil, ISOTONICO E ISOOSMOLAR de 50 a 100mL, compuesto de IOXAGLATO DE MEGLUMINA 39,30g y IOXAGLATO DE SODIO 19,65g cada 100ml
4		RAD			M. DE CONTRASTE GENITAL FEMENINO	Frasco ampollas de MEDIO DE CONTRASTE PI/APARATO GENITAL FEMENINO conteniendo IOXITALAMATO DE MEGLUMINA 55 % P/V en envases de 20mL
8		RAD			M. DE CONTRASTE PARA TAC NO IONICO (iobitridol ó iobersol) x 50 ml	Envases conteniendo Medio de Contraste No Ionico de baja osmolalidad para uso en Tomografía computada conteniendo IOBITRIDOL 65,81g (equivalente a 30g de Iodo) cada 100mL de solución en ampollas de 50mL o IOBERSOL al 68 % con concentración de Iodo de 320mg/mL en envases de 50mL
					Medio de Contraste Iodado hidrosoluble, no iónico, iso o hipoosmolar con una concentración equivalente a 300mg de Iodo/mL, frasco ampolla x 50 ml	

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
4		RAD			<p>Medio de Contraste Iodado hidrosoluble, no iónico, iso o hiposmolar con una concentración equivalente a 370mg de Iodo/MI, frasco ampolla x 50 ml</p> <p>M. DE CONTRASTE SULFATO BARIO p/DIG ALTO suspensión</p>	<p>Envases conteniendo POLVO DE SULFATO DE BARIO para uso en radiología con comprimidos ó sobres con polvo efervescente de 340g para preparar suspensión que brinde óptima adherencia a la mucosa y no produzca formación de flóculos</p>
4		RAD			<p>M. DE CONTRASTE SULFATO BARIO p/enema (c/aplic)</p>	<p>Envases de material colapsable, que permita la insuflación sin dificultad de MEDIO DE CONTRASTE A BASE DE SULFATO de BARIO en POLVO (no en suspensión), para ser usado como enema opaca, con o sin citrato y provisto de accesorios (tubuladuras y cánula.s) correspondientes, que brinde óptima adherencia a la mucosa y no produzca formación de flóculos. El material de los accesorios debe ser de calidad adecuada y su rigidez no debe ser excesiva</p>

FÁRMACOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTUDIOS CONTRASTADOS

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
4		RAD			M. DE CONTRASTE UROGRAMA EXCRETOR AMP	Frasco-ampollas de Medio de Contraste Radiológico para UROGRAMA DE EXCRECIÓN, VIAS BILIARES, COLANGIOGRAFIA, y TAC, a base de IOXITALAMATO DE SODIO 9,66g e IOXITALAMATO de MEGLUMINA 65,09g/100mL o IOXITALAMATO de MEGLUMINA 600mg/mL, con una concentración de yodo de 282mg/mL
4		RAD			POLIETILENGLICOLI	Preparación colónica en pacientes con factores de riesgo para IR, DBT, IC, ascitis, mayor de 70 años o que estén utilizando IECA, ARA II y diuréticos

20. EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS

Siempre comunicarse telefónicamente a centros de referencia Toxicológica. Las siguientes recomendaciones son una guía inicial hasta contar con información individualizada brindada por especialistas

FÁRMACOS INDICADOS COMO ADSORBENTES

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
3		MG		SI	CARBON ACTIVADO sobres x 20 gramos	Dosis 1 gr /kg peso disueltos en 100-150 cc de agua o gaseosa (no pierde propiedad adsorbente), cuchara sopera al ras equivale a aprox 15 grs. Administrar lo antes posible. Si se administra por SNG, antes de retirar la misma se la debe pinzar para evitar aspiración pulmonar. Acompañar de catárticos excepto contraindicaciones (ver catárticos en este capítulo)

FÁRMACOS INDICADOS COMO CATÁRTICOS EN INTOXICACIONES

3		MG		SI	HIDROXIDO DE MAGNESIO x 120ml.	Uso en Intoxicaciones como catártico. En tratamiento con Carbon activado seriado
					POLIETILENGLICOL	Uso para irrigación intestinal total (sustancias que no se adsorben al carbón activado, body packers, etc.)

INTOXICACIÓN CON PARACETAMOL

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
4	SI	MG		SI	N-acetilcisteína 600 mg comprimidos y jarabe al 20% (NO ES EQUIVALENTE a la N-AC al 20% utilizada en intoxicaciones)	Antidoto en Intoxicación por paracetamol Dosis carga 140 mg/kg vo Dosis mantenimiento 70 mg/Kg c/4 hrs hasta completar 17 dosis (3 días): En prevención de Nefrotoxicidad por estudios contrastados en pacientes de alto riesgo dosis 600 mg c/12 comenzando el día anterior al procedimiento (es decir 4 dosis en total).

INTOXICACIÓN CON ANALGÉSICOS OPIOIDES

3		MG		SI	NALOXONA 0,4 mg/ml ampollas x 1 ml	<p>Antidoto en intoxicación por opiáceos, dosis inicial en adultos 0,4 a 2 mg y en niños 0,01 mg/Kg. Ante falta de respuesta puede elevarse la dosis a 0,1 mg/Kg. Uso por vía ev/sc/endo-traqueal. El efecto dura 30-45 minutos por lo que puede requerirse infusión continua a 0,4 mg/hora. Puede desencadenar S. de abstinencia en adictos a opiáceos. En adolescentes y adultos dosis inicial menos concentrada si se sospecha dependencia a opiáceos: 0,05 mg y escalar hasta 0,4mg → 2mg e ir aumentando dosis hasta 10mg. Si no revierte con esta dosis, buscar otras causas del cuadro. La dosis de mantenimiento con naloxona</p> <p>dependerá de la dosis total con que se revirtió la depresión respiratoria. Dosis recién nacidos, menores de 5 años o <20kg de peso: 0,01 mg/kg (Dmáx 0,1mg) cada 2-3'. Niños mayores igual dosis, pero Dmáx de 0,2mg</p>
---	--	----	--	----	------------------------------------	--

INTOXICACIÓN CON BETABLOQUEANTES

NIVEL DE COMPL E- JIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
					<p>GLUCAGON (ampolla de 1mg)</p>	<p>Dosis inicial ADULTOS: 3-5 mg (EV) en 1-2 minutos. Si no hay mejoría hemodinámica en 5' el retratamiento con 4-10 mg puede ser efectivo. Se puede hacer infusión continua a 2-5mg/hora (hasta 10mg/h) en Dx 5% Dosis inicial NIÑOS: 50 ug/ kg (EV) en 1-2'.</p> <p>Puede haber taquifaxia (por eso considerar bolos repetidos en vez de BIC)</p> <p>Efectos adversos: náuseas, vómitos, hiper/hipoglucemia, hipokalemia, relajación de músculo liso de tracto GI (OJO con ileo). Raro: urticaria, distress respiratorio, hipoTA, crisis hipertensiva si tiene feocromocitoma. El tratamiento prolongado puede dar miocardiopatía dilatada.</p>

Atropina (Ver más abajo en intoxicación por organofosforados)

INTOXICACIÓN CON HIPNÓTICOS – ANSIOLÍTICOS

INTOXICACIÓN CON BENZODIAZEPINAS

NIVEL DE COMPL E- JIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
3		MG		SI	FLUMAZENIL 0,1 mg/ml. amp x 5 ml.	<p><i>Intoxicación conocida (o sospechosa) con benzodiazepinas (aprobada por FDA en adultos)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Antagonizar el efecto de las benzodiazepinas usadas en anestesia general (aprobada por FDA en adultos y niños mayores de 1 año) <p>NOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> • No debe administrarse en forma rutinaria en pacientes en COMA DE ORIGEN DESCONOCIDO (Micromedex, 2017) • En pacientes con sobreingesta de múltiples fármacos que se encuentran en estado crítico, no se conoce ningún beneficio del tratamiento con flumazenil

INTOXICACIÓN CON SALES DE HIERRO

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD PARA REALIZAR LA PRESCRIPCIÓN	HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
8			Guardia HPN		SI	<p>DEFEROXAMINA frasco ampolla de 500 mg. Reconstituir con 5 ml de agua estéril para administración endovenosa y con 2 ml para administración intramuscular. Debe obtenerse una solución limpia (coloración amarillenta de intensidad variable).</p>	<p>Intoxicación aguda con hierro Aprobada por FDA para tratamiento en adultos y niños mayores de 3 años. Pacientes asintomáticos: – Ingesta estimada igual o mayor de 60 mg/kg de hierro elemental o – Ferremia mayor a 500 µg/dl 4 horas posteriores a la ingesta o – Radiología abdominal positiva (visualización de imágenes radiopacas) Pacientes sintomáticos: – Cuadro clínico con: vómitos repetidos, hipotensión arterial, signos de shock, acidosis metabólica, estado mental alterado y/o apariencia tóxica.</p>

INTOXICACIÓN CON CIANURO

8			Guardia HPN		SI	<p>NITRITO DE SODIO AMPOLLAS 3% IMPORTANTE FALTA AGREGAR AL BOTIQUÍN: HIPOSULFITO DE SODIO 25% (ya sugerido en 2014)</p>	
---	--	--	-------------	--	----	--	--

INTOXICACIÓN CON ETILENGLICOL Y METANOL

NIVEL DE COMPL E- JIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
4		MG		SI	<p>ALCOHOL ETÍLICO medicinal diluido al 20% para dar por SNG ó etanol estéril para vía EV diluido al 10%</p>	<p>En intoxicaciones graves por metanol o glicoles administrar por vía oral (diluido en agua o jugo) o endovenosa (diluido en dextrosa) dosis inicial 0,75 ml/Kg seguido de 0,5 ml/Kg cada 4 hrs por 48-72 hrs. - Misma dosis en adultos y niños. Alcohol estéril para dar por vía EV: en 1 litro de Dx5% quitar 100 cm³ y reemplazar por 100 cm³ de etanol absoluto apto para vía endovenosa. El etanol al 20% para dar por SNG: en 800 ml de jugo o Dx 5% agregar 200 ml de etanol absoluto. La etanolemia buscada para que sea efectivo es de 100-150 mg%</p>

INTOXICACIÓN CON METALES PESADOS

INTOXICACIÓN CON ANTIMONIO, ARSÉNICO, BISMUTO, ORO Y MERCURIO

NIVEL DE COMPL E- JIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
8		Guardia del HPN		SI	Dimercaprol (BAL) ampolla 2 ml (50 mg/ml) ó BAL in OIL ampolla de 3 ml (100 mg/ml).	INTOXICACION AGUDA CON ARSENICO. INTOXICACIÓN AGUDA CON MERCURIO INORGÁNICO. INTOXICACIÓN CRÓNICA CON PLOMO (con encefalopatía, o plumbemia >100 ug/ml en adultos o >60 ug/ml en niños)

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
8		Guardia externa del HPN			SUCCIMER (Ácido 2,3-Dimercaptosuccínico) suspensión vía oral	Intoxicación infantil (mayores de 1 año) con plomo, con plumbemias >45 ug/dl. Para uso en adultos es efectivo pero no tiene aprobación por FDA en tal indicación. Sin aprobación de FDA para arsénico y mercurio.
8		Guardia del HPN			D- PENICILAMINA (Cuprimine®) suspensión vía oral. SIEMPRE suplementar con piridoxina y NO indicar a pacientes alérgicos a penicilina.	Quelante de tercera línea en la intoxicación con plomo en los casos en que no puede utilizarse EDTA o succímero y la terapia quelante deba ser instaurada.

INTOXICACIÓN CON PLOMO

8		Guardia del HPN			EDETATO DISÓDICO DE CALCIO (CaNa₂-EDTA) ampollas 5ml al 20% (Calcium-C-Inca = ampolla de 5 ml contiene 1 g de EDTA).	Intoxicación con plomo, con plumbemia mayor a 60 µg/ml en adultos o mayor a 45 µg/ml en pediatría. Aprobada por la FDA en la intoxicación con plomo (adultos y niños).
---	--	-----------------	--	--	--	--

INTOXICACIÓN CON GASES

INTOXICACIÓN CON MONÓXIDO DE CARBONO

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
Oxígeno						
	Manitol (Ver Capítulo 2 CARDIOVASCULAR. Diuréticos osmóticos)					

INTOXICACIÓN CON PLAGUICIDAS

INTOXICACIÓN CON PARAQUAT				
Carbón activado (Ver más arriba)				
INTOXICACIÓN CON 2,4 - D				

INTOXICACIÓN CON ORGANOFOSFORADOS

NIVEL DE COMPL E- JIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
3		MG		SI	ATROPINA 1 mg ampollas x 1 ml	<p>Tratamiento de las manifestaciones clínicas muscarínicas (ejemplo: broncorrea, broncoconstricción, vómitos, diarrea, diaforesis, etc.) secundarias a la intoxicación por agonistas muscarínicos.</p> <p>Tratamiento de la bradicardia sintomática secundaria a xenobióticos (ejemplo: β bloqueantes, bloqueantes cálcicos, etc.).</p>
8		MG		SI	<p>PRALIDOXIMA MESILATO 200 mg frasco ampolla.</p> <p>Preparar en SF o Dx 5% y proteger baxter y guía de la luz. Dosis máxima 2 g/día.</p>	<p>Intoxicación moderada a severa por compuestos organofosforados (mejora los síntomas nicotínicos y sinergia la acción de la atropina). Posee mayor eficacia administrándola antes de las 24-36 horas posteriores a la ingesta del organofosforado. NO REEMPLAZA EL USO DE ATROPINA PARA CONTROL DEL SÍNDROME MUSCARÍNICO.</p>

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
----------------------	------------------------	--	----------------------------	---------------------	--------------	--

METAHEMOGLOBINEMIA

				SI	AZUL DE METILE- NO ampollas 1%	<i>Metahemoglobinemia < 25 % sintomático</i> <i>Metahemoglobinemia > 25 %</i>
--	--	--	--	----	-----------------------------------	--

S

INTOXICACIÓN CON HEPARINA

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIÓN DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
8				SI	SUERO ANTICRO-TALUS	Mordedura de CASCABEL
8				SI	SUERO ANTIMI-CRURUS	Mordedura de CORAL
8				SI	SUERO BOTHROPS BIVALENTE	Mordedura de YARARA
3	SI	MG		SI	SUERO INMUNE ANTILACTRODECTUS	ARAÑA LACTRODECTUS
8				SI	SUERO INMUNE ANTIOFIDICO POLIVALENTE	Polivalente se refiere sólo al anti bothrops tetravalente que se fabrica exclusivamente para provincia de Misiones. Lo sacaría del manual FT de NQN.
8		INF		SI	SUERO INMUNE ANTIBOTULINICO	ANTITOXINA

INTOXICACIÓN CON HEPARINA

NIVEL DE COMPLEJIDAD	RECOMENDACIÓN ES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	CARRO DE EMERGENCIA	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
8				SI	SULFATO DE PROTAMINA	SANGRADOS GRAVES SECUNDARIOS A HEPARINA O ADMINISTRACIÓN DE DOSIS MASIVAS DE LA MISMA (LA MAYORÍA IATROGENIA).

INTOXICACIÓN CON ANTIPSICÓTICOS

					<p>Ampollas 5 mg/ml (no disponibles en Argentina). Comprimidos 2 mg: vía oral DEBIDO A LA CARENCIA DE FORMA PARENTERAL, SUGERIR TRATAMIENTO DE DISTONIAS CON DIFENHIDRAMINA O LORAZEPAM</p>	<p>Indicaciones aprobadas por la FDA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Síndrome extrapiramidal (sólo en adultos) • Parkinsonismo (sólo en adultos) • Trastorno del movimiento inducido por medicamentos • Pacientes con intolerancia o refractarios a fármacos dopaminérgicos
--	--	--	--	--	---	---

TELÉFONOS DE CENTROS HOSPITALARIOS CON DEPARTAMENTOS DE TOXICOLOGÍA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA'

**CENTRO DE TOXICOLOGÍA del
Hospital General de Agudos J. A.
Fernández** 011-4808-2655

**CENTRO DE TOXICOLOGÍA del
Hospital Pediatría "Sor María
Ludovica" (La Plata)** 0-800-222-9911

**CENTRO DE TOXICOLOGÍA del
Sanatorio de Niños en Rosario** 0341-448-0202

**CENTRO DE TOXICOLOGÍA del
Hospital de Niños "Dr. Ricardo
Gutiérrez"** 0-800- 444-8694
011-4962-6666

**CENTRO NACIONAL DE
INTOXICACIONES – Servicio de
Toxicología del Hospital Nacional
"Prof. Alejandro Posadas** 0-800-333-0160
011-4658-7777

21. CONTRACEPTIVOS

21.1 CONTRACEPTIVOS HORMONALES ORALES

NIVEL DE COMPLIENCIA	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
II	#	MG/Lic. En obstetricia/ Gineco-Obstetras	*	Etinil Estradiol 30mcg/Levonorgestrel 150mcg	Anticonceptivo de 1ª línea
II		MG/Lic. En obstetricia/ Gineco-Obstetras	*	Levonorgestrel 30mcg	Anticoncepción durante lactancia
II		MG/Lic. En obstetricia/ Gineco-Obstetras	*	Levonorgestrel 750 mcg pack de dos o 1 de 1,5 mg	Anticoncepción de Emergencia

* PUEDE PRESCRIBIRSE EN MENORES DE EDAD. LAS LEYES Y CODIGOS ARGENTINOS ADMITEN LA CONSULTA Y LA CONFIDENCIALIDAD SIN PARTICIPACIÓN DE ADULTOS DESDE LOS 14.

INFORME DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA SANITARIA ANTICONCEPTIVOS ORALES ETINIL ESTRADIOL 30MCG/LEVONORGESTREL 150MCG COMPARADOS CON ETINIL ESTRADIOL 20MCG/GESTODENO

21.2 CONTRACEPTIVOS HORMONALES INYECTABLES

II	#	MG/Lic. En obstetricia/ Gineco-Obstetras	*	Cypionato de estradiol 5mg/Acetato de medroxiprogesterona 25mg	Anticoncepción Inyectable mensual
----	---	---	---	---	--------------------------------------

NIVEL DE COMPLETUDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
II	#	MG, LO, GIN, OBS	*	Acetato de medroxiprogesterona 150mg/amp 1ml	Anticoncepción Inyectable trimestral
I			*	Enantato de noretisterona 200mg/amp 1ml	Anticoncepción Inyectable bimensual

21.3 CONTRACEPTIVOS IMPLANTABLES HORMONALES

NIVEL DE COMPLETUDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
4/6 Porqué no podría colocarlo un MG en el Centro de Salud? Lo puede poner cualquiera que se entrene	Informe Breve de ETS de Implantes de desogestrel	MG, LO, GIN, OBS	*	Implante subdermico etonogestrel 68mg	<p>Deben colocarlo personas con entrenamiento mínimo. Indicado en menores de 20 años con un evento obstétrico previo (embarazo, aborto o E. Ectópico). Los casos de excepción por otras indicaciones deben solicitarse con formulario de excepción</p> <p>Revisar esto porque hoy ya no es así según MSAL que es el que provee (según las evidencias no fue así nunca. Es un anticonceptivo óptimo para la que elija tenerlo)</p>

21.4 MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS DE BARRERA

NIVEL DE COMPL E- IIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
II		MG, LO, GIN, OBS	*	Condomes	

21.5 DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS

NIVEL DE COMPL E- IIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	ESPECIALIDAD HABILITADA PARA REALIZAR LA PRIMER PRESCRIPCIÓN	REQUISITOS DE PRESCRIPCIÓN	MEDICAMENTOS	INDICACIONES, RESTRICCIONES, OBSERVACIONES
			*	DIU con cobre	Anticoncepción, puede utilizarse en nulíparas, mujeres jóvenes, como anticoncepción de emergencia y en el postparto inmediato en la lactancia Duración años 10 años
	Informe de ETSSIU		*	SIU	Anticoncepción asociada a Hipermenorrea o menometrorragias con afectación significativa de la calidad de vida. Duración 5 años



ABREVIATURAS

MG: Medicina general

CM: Clínica Médica

PED: Pediatría

AN: Anestesiología

INF: Infectología

CAR: Cardiología

UTIA: Unidad de Terapia Intensiva de Adultos

UTIP: Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica

CAR INF: Cardiología Infantil.

NEO: Neonatología

GIN: Ginecología

RAD: Radiólogo

OFT: Oftalmología

ODO: Odontología

END: Endoscopia

NEF: Nefrología

NEUROQX:

Neurocirugía

PSIQ: Psiquiatría

NEUR: Neurología

ENDOC:

Endocrinología

HEMOT: Hemoterapia

END: Endoscopistas

FAR: Farmacia

ONC: Oncología

OBS: Obstetricia

REU: Reumatología

DER: Dermatología

NEU: Neumonología

QX: Cirugía

NEF: Pediatría

HEM: Hematología

NEU PED: Neumonología pediátrica

TRA: Traumatología

HEP: Hepatología

GAS: Gastroenterología

LO: Licenciada en Obstetricia

PAL: Equipos de cuidados paliativos

TRA PED: Traumatología pediátrica

OyT: Ortopedia y traumatología

URO: Urología

ER: Emergencias



GOBIERNO
DE LA PROVINCIA
DEL NEUQUÉN

MINISTERIO
DE SALUD

SUBSECRETARÍA
DE SALUD

NEUQUÉN
PROVINCIA

JUNTOS
PODEMOS
MÁS

BIBLIOGRAFÍA

¹ INTOXICACIONES POR MONÓXIDO DE CARBONO DIRECTORIO DE CENTROS DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TOXICOLÓGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (Según ubicación geográfica) Ministerio de Salud de Argentina. http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000516cnt-Directorio_de_centros_de_informacion_toxicologica.pdf