CASO SOSPECHOSO DE DENGUE

CON ANTECEDENTES DE VACUNACIÓN

INTERNADO Y/O DENGUE GRAVE*

- FIS ≤ 30 días desde la vacunación
  - Diferenciar dengue vacunal de salvaje
  - Notificar como CASO SOSPECHOSO DE DENGUE Y ESAVI y realizar las acciones de control de foco correspondientes
  - Estudiar con qRT-PCR para luego realizar secuenciación
  - la clasificación de caso se mantiene como sospechoso hasta el resultado de la secuenciación
- FIS > 30 días desde la vacunación
  - Seguimiento por enfermedad aumentada vacuna
  - Notificar como CASO SOSPECHOSO DE DENGUE Y ESAVI y realizar las acciones de control de foco correspondientes
  - Estudiar con métodos directos (no serología) y en caso de resultado positivo enviar a secuenciación
    - Detectable: caso confirmado de Dengue
    - No detectable: Caso sospechoso no conclusivo

DENGUE NO GRAVE

- FIS ≤ 30 días desde la vacunación
  - No realizar estudios diagnósticos
  - Notificar como CASO SOSPECHOSO DE DENGUE Y ESAVI y realizar las acciones de control de foco correspondientes
- FIS > 30 días desde la vacunación
  - Notificar como CASO SOSPECHOSO DE DENGUE Y ESAVI y realizar las acciones de control de foco correspondientes
  - Estudiar con métodos directos (no serología)
    - Detectable: caso confirmado de Dengue
    - No detectable: Caso sospechoso no conclusivo

***Dengue con criterios de enfermedad grave:** choque o dificultad respiratoria debido a extravasación grave plasma; sangrado grave, según la evaluación del médico tratante; compromiso órganos (hepatitis, miocarditis, encefalitis, etc.)

Referencias: FIS: Fecha de inicio síntomas, qRT-PCR: Reacción en cadena la polimerasa tiempo real.